



RS  
180  
J3T3  
1935  
v.2

Tamba, Yasuyori  
Ishin ho

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---







顧問

井上通泰先生  
山田孝雄先生  
新村出先生

正宗敦夫

編纂  
校訂

# 醫心方



自四卷  
至八卷

合資  
會社

日本古典全集刊行會壽梓




阿  
出  
生  
五  
帝  
錄  
夫  
神  
學



RS  
180  
J3T3  
1935  
V. 2

日本古典全集  
計  
卷  
終



醫心方卷第四

後五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治駁令生長方第一

治駁令光軟方第二

治駁令堅方第三

治白駁令黑方第四

治鬚駁黃方第五

治鬚駁禿落方第六

治頭白禿方第七

治頭赤禿方第八

治鬼蛾頭方第九

治頭燒駁不生方第十

治眉脫令生方第十一

治毛駁安生方第十二

治頭面瘡方第十三

治面皯方第十四

治面肝蠅方第十五

治面皰皰方第十六

治飼面方第十七

治癰瘍方第十八

治白癰方第十九

治赤疵方第二十

治黑子方第二十一

治疣目方第二十二

治創癰方第二十三

治胡虻方第二十四

治駁令生長方第二十五

病源論云駁是足少陰之經血所榮也血氣盛則駁長養若血虛少則駁不長故須以藥治之令長也

僧深方生駁澤蘭膏方



細辛二兩 蜀椒三升 續斷二兩 杏人三升

烏頭二兩 皂莢二兩 澤蘭二兩 石南二兩

厚朴二兩 茵草二兩 白朮二兩

凡十一物咬咀以厚苦酒三升漬銅器中一宿以不中水脂  
肪成煎四斤銅器中東向竈炊以葦薪三沸三下  
膏成以布絞去滓校白塗之

生駁膏生長駁白黃者今黑魏文帝秘方

黃耆二兩 當歸二兩 獨活 廿二 白芷 夕藥

茵草 辛夷 防風 生地黄 大黃 蒿本



蛇銜 各兩

生薤白半斤 麻油四升 馬蹄膏二升

凡十六物切投火煎三上三下白芷黃膏成去滓傳  
頭二方加射香二方

千金方治駃令長方

麻子二升熬令黑押取脂付頭

又方麻葉束葉白酒者藥氏云去滓沐駃七遍長六尺

又方多取烏麻花白麝藥氏云盛密蓋埋之百八日用

塗駃長而黑

葛氏方治駮令長方

术一升剉之水五升煮以沫不過三即長

新錄方治駮令長方

烏麻花末之以生油和泥塗之

又方每暮好蜜塗如上七日生

本草經云鯉腸汁塗駮眉生速而繁

注云名蓮子草

如意方云長駮術

東行棗根直者長三尺以中央當翫飯蒸之承兩

頭汁以塗頭駮長七尺

又方白芷四兩煮沐頭長髮

又方麻子人三升白桐葉一把米汁煮去滓適寒溫以  
沐廿日髮長

又方麻子人三升秦椒二升合研漬之一宿以沐頭日一  
長髮二尺

又方乙卯丙辰日沐浴令人髮長

治髮令光軟方第二

如意方軟髮術

沐頭竟以酒頤更濯之髮即軟

廿

又方新生烏鷄子三枚先作升麻沸湯煮楊之令  
溫破鷄子患內湯中攪令和復煮令熟方為三沐  
三灌之三日一沐令髮軟

又云光髮術

搗大麻子蒸令熟以汁潤髮令髮不新生光澤

大良

治髮令堅方第三

延壽赤書云大極經曰理髮耳向王地當數易棉之亂  
多而不使痛亦可令侍者棉之取多佳也於是面

脉不滯駁根當堅

卷中方同入

如意方云堅駁術

馬蘭灰升一孟實一名紫寧灰升胡麻灰七升 凡三灰

各之淋之先用馬蘭灰汁次用紫寧灰汁後

用胡麻灰汁

治白駁令黑方第四

病源論云血氣虛則腎氣弱則骨髓枯湯故駁變

白也

又云千過梳駁人不自又云四月一日取五香煮作湯沐頭



南

不白

隨煬帝後宮香藥方染白髮大豆煎

酢漿 大豆右二物以漿煮大豆以染之黑便如染

葛氏方治白髮方

先沐頭髮令淨取白灰胡粉分等漿和溫之夕卧

塗傳訖油衣柁裹明日洗去便黑錄驗方同之

又方按白毛仍以好蜜傳孔處即生黑

千金方治髮白方

正月四日二月八日三月十三日四月廿日五月廿日六月廿日七月廿

八月十九日九月廿五日十月十日十一月十日十二月十日

右日校之不復白

又方烏麻九蒸九曝和末久來膏九服之

又方生油漬烏梅當用付頭良

靈竒方令白駮還黑術方

隴西白芷一升 旋復升 秦椒一升 好桂心一斤

合搗篩并花水服方寸匕日三升日駮悉黑禁房內以此

藥食白犬子廿日皆變為黑千金方周之

僧深方欲令駮黑方

八角附子一枚淳苦酒半升於銅器中煎令再沸內  
好燹石大如博其石一枚燹石消盡內好香脂三兩和  
合相得下景地敷洗暗敷取量筒中按白髮以脂塗  
其處日三

極要方染鬚髮白數用大麻子泔浴之極佳

龍門方治髮白方

用皂莢湯淨洗乾拭以陳久油滓塗之日三

千金方同之

孟詵食經治白髮方

胡桃燒令烟盡研為泥和胡粉按白毛付之即生毛

今案本草

醫心方卷四

拾遺為泥拔白髮以  
內孔中其毛皆黑

如意方添髮白術

取穀實搗取汁和水銀以拭髮皆黑

又方熟栗槌以水潰服之令髮黑

又髮及白髮術

以五八午日燒白髮

又方吳茱萸日除白髮甲子日燒之自折

流鬚髮黃方第五

病源論云足太陽之經面外榮於髮頭血氣盛則髮美而

長若虛少不足不榮潤於外故令鬚黃也

葛氏方治鬚駁黃方

燒梧桐作灰乳汁和以塗其膚及鬚駁即黑

如意方治鬚黃術

胡粉白灰分等以水和塗鬚一方漿和夕塗明日洗去便黑

錄驗方治鬚駁神驗如漆方

胡粉三兩石灰三升以酒和粉灰等二兩煮沸及暖  
揩洗駁令遍急痛水以濯之經宿且還直暖陰



甘洗濯又以冷水灌塗油即黑如漆

今案范任方先洗頭鬢垢

治鬚髮禿落方第六

病源論云血盛則榮於頭髮故鬚髮若血氣衰弱不能榮潤故鬚髮禿落也

經心方治中風髮落不生方

鐵生衣下篩鴈月猪脂合煎三沸塗日三度亦

治眉落

葛氏方治鬚髮禿落不生長方

麻子三升 秦椒二升 合研置潘汁中一宿去

渾日一沐一月長二尺

又方生栢葉一斗附子四枚搗末以猪肪三斤合和為  
卅丸布裹丸著沐汁中間日一沐駁長不落

醫門方治駁落方

油磨鐵衣塗之即生

又方桑根白皮三升大麻子二升 白桐葉切一升半

右泔九升浸經一宿煮五六沸去滓以泔浴駁

千金方云治鬚駁隨落方

麻子三升碎 白桐葉切一把 米泔汁二升煮五

六沸去滓以洗沐頭鬚數不落廿日驗葛氏方同之

如意方治鬚髮禿落術

桑樹皮削去黃黑取白剉三升以水淹煮五沸去滓以洗沐  
鬚髮數為不落

又方甘草二兩咬咀漬升湯中沐頭不過再三則不落  
治頭白禿方第七

病源論云凡人有九虫在腹內值血氣虛則侵食而蛻虫  
發動最能生瘡乃成仍成疽癰瘍疥之屬无所不為言白  
禿者皆此虫作謂在頭上生瘡有白痂甚癢其上駮

並禿落不生故謂之白禿也

千金方治禿頭方

燕菁子末酢和付之日一

又方油磨鐵衣塗之即生

又方麻子桑末研內泔中一宿去滓日沐一月長二尺

又云白禿方

黃桃皮汁飲之并洗上

又方麴豉兩種下篩酢和薄上

又方炒大豆黑末和猪脂炙暖匙抄封上即裏勿見

風 又方桃花和猪脂封上

槌要方療頭風痒多白屑方

大麻子人三升研 秦棘二升 栢葉切三升

右並置於泔汁中一宿明旦溫之法澤用已沐髮  
今案集驗

方元  
栢葉

治頭赤壳方第八

病源論云赤壳者无白痴有汁皮赤而癢故謂之

此由頭瘡生食賊壳落

赤壳

千金方治赤壳方



來灰汁洗搗榘封日中曝頭

又方馬蹄灰末猪脂和付之

又方燒牛羊角灰和猪脂付之

治鬼舐頭方第九

病源論云人有風邪在於頭有偏虛寒則髮落肌肉枯死或如錢大或如指大駭不生不瘡故謂之鬼舐頭也  
千金方治鬼舐頭方

燒猪兒猪心矢臍月猪脂和付之

又方燒麝香研付之

又方赤埴末和蒜搗付之

治頭燒瘰癧不生方第十

病源論云夫瘰之生血氣<sub>宣</sub>時潤養也火燒之瘰瘡痕  
縫窻則氣血下沉不能榮<sub>宣</sub>湊理故瘰不生也

如意方生毛瘰術云

取烏內器中埋於丙丁上入三足百日以塗人穴即生毛

又方塗好蜜

千金方治火燒創瘰毛不生方

蒲灰二月荷臨和付毛生 又方蕪菁子末酢和塗

毛生

治肩脫令生方第十一

病源論云血氣盛則養肩有豪甚血少則肩要又為風邪所傷肩脫皆是血氣損傷不能榮養也故須以藥生之

千金方生肩毛方

壚上青衣鐵精分等和水塗之

又方七月烏麻花陰干生烏麻油和三日一塗肩發

如意方肩中元毛方

以針挑傷付蜜生毛

新錄單方生眉毛方

油和鐵精研塗眉

又方每暮好蜜塗七日亦生又方鐵汁數洗之

治毛駁妄生方第十二

病源論云若風邪乘經絡血氣改變則異毛惡駁妄生則須以藥令不生之

新錄方校去毛以蜂灰和鼈脂塗之永不生

千金方同之

又方去毛用獼猴等膽塗即永不生

千金方同之

又方拔去毛以伏翼面塗之不生

千金方除目枝毛散冀脂塗之

又方狗乳塗之 又方東行棗根灰水和塗之

治頭面瘡方第十三

病源論云內熱外虛為風濕所乘濕熱相搏故頭面身  
軀皆生瘡

如意方治面上惡瘡術

胡粉五兩 黃蘗 黃連五兩

三物治下齋粉面瘡上目三

小瓶方同之



搗惡方療面上瘡極痒搔即生瘡黃脂名曰肥瘡方

右煮苦參汁洗去痂故爛帛淹即塗白蜜自當汁  
書如膠即付雄黃末不過二兩度是

又云治頭面惡創胡粉膏方

胡粉三兩 松脂二兩 水銀三兩 猪脂六合 凡四物杵  
脂猪脂合煎去滓以水銀胡粉著中攪使和塗瘡上日三  
膏藥方治頭面生瘡瘻黃連膏方

黃連四兩 白薇二兩 大黃三兩 麝黃二兩 胡粉二兩  
右五物下篩以猪膏和塗之時以塩湯洗之

今案梨蘆膏可付之在第十卷小兒頭瘡條

治面蛇瘡方第十四

病源論云面蛇者謂面上有風熱氣生蛇或如米大或如穀大白色者是也又云養生方云醉不可露卧令人面發瘡蛇

和名尔文券

飲  
養生要集云酒醉勢未解勿以冷水洗面致瘡輕者蛇

如意方治蛇術

蘆薈二分 桂末一分 下篩以酢漿根服方寸匕日三服即

服支子散相參也

支子散方 支子一斤搗下篩先食以酢漿服方寸匕

日三先服蒼朮桂散次後服支子散即以同日服之

錄驗方治男女配面生創黃連粉方

黃連二兩 牡蠣兩 凡二物下篩有膿汁以散粉之

葛氏方治年久氣盛面生蛇瘡方

鷹矢白二分 胡粉一分 蜜和塗上日二

又方以三歲苦酒漬鷄子三宿當軟破取汁塗良

極要方面蛇蟬腫方

白附子二兩 青木香二兩 麝香二兩 拔薤二兩  
並為散以水和塗面日三

小品方治面皯方

五朮治以水銀胡粉青羊脂分等和傳面上日三有効  
又方胡粉二分 水銀四分以猪膏和研傳面天曉以布拭  
去勿洗水

千金方治面皯甚者方

冬葵子 栢子仁 伏苓冬小 茯苓 凡四味分等服方寸

匕日三 今案握要方尋面目光澤此氣盡去

劉涓子方治雀斑方

鸚鵡屎外下前心臍月猪膏和傳之千金方同之

新錄方治面皯方

搗杏仁為泥和漿若酪塗之

又方取菟絲上秋露洗之取佳

又方大麻子研和猪脂塗又方脂塗拭面上自免

治面皯方第十五

病源論云面皯皯者謂面皮上或有如烏麻或如雀卵上

之色是也此由風邪客於皮膚腠液積於府藏故變生積肝




黧也 和名於毛加尔

養生要集云凡遠行途中逢河水勿洗面生烏酡狀如烏  
甲之色斑也

葛氏方治面多酡黧或如雀卵色方

苦酒漬术恒拭面稍自去

又方桃花依子分等搗ハ傳面



千金方治面酡方

搗生菟絲草汁塗五不過三

又方李子人未和鷄子白傳一宿即落

又方杏人酒漬皮脫搗絹囊盛夜拭面

小品方治面痒方

白蜜和伏苓塗滿之七日便差

又方杏人去皮治今細鷄子白和之傳經宿拭去

槌要方治面上黥黑粉澤等方

白益三分 生礬石一分 白石脂二分 杏人半分 去皮

右為散以鷄子白和夜卧塗之明曉以井花水洗之  
者更少黑者白潤

如意方治黥艷術

鷓鴣白矢傳之 又方以樹穴中水洗之

又方伏苓卷七白石脂久等末蜜和塗之日三

新錄方取茯苓末蜜和塗之 又方豬膽汁塗面

僧深方桃人治下篩鷄子白和以塗面日四五

蘓敬本草注以桑薪灰洗之

陶景本草注取蜂子末成頭足時以酒漬傳面今悅

白

治鼻齖方第十六

病源論云此由飲酒熨勢衝面而遇風冷之氣相

搏所生也故令鼻面間生瘡赤蛇逆之然者是也和名

安加波奈

葛氏方面及鼻宿酒皸方

鸚鵡矢末ハ臘月猪膏和塗之鸛矢ハ佳

僧深方治查疔癰疾藥散方

疾梨子 支子人 香豉各一升 木蘭皮半斤

九四物下篩酢漿和如泥暮卧塗病上明且湯洗去

千金方治查鼻蛇支子丸方

芎藭四兩 大黃六兩 支子人三升 好豉三升 麩

木蘭半斤 甘草四兩

右市味蜜和服十九如梧子日稍加至廿五丸

僧深方云女子

人并香散三升服十九日三不知增之

小品方治面瘡木蘭散方

木蘭皮一斤漬以暑三年酢中趣令浸之百日出木

蘭皮曝燥搏為散服方寸匕日三食方同之

新錄方治鼻齖方

木蘭皮艾子人豉等分為酢和如泥塗上日一

消人

劉涓子方木蘭膏治隨鼻方

醫心方云

十一



木蘭二兩 艾子三兩 凡二物細切漬苦酒一宿明日以猪  
膏外煎去滓稍以摩之

如意方治面瘡術云前治胞暮蒼桂完方亦治之在面肥方  
治餽面方第十七

病源論云餽面者面皮上有滓如米粒者也此由膚湊  
受於風耶搏於津液之氣因虛作之也亦言因傳  
胡粉而皮膚著害者粉氣入湊理化生之也和名以呂古於毛天  
葛氏方治卒病餽面如米新傳者方

十月霜初下取洗拭面乃傳諸藥為佳

又方白麤三分生白石一分白石暗分杏仁半分搗末  
鷄子白和暮卧塗面明且井花水洗之一方元龜石  
白暗有鷄子白蜜和新水拭之

范汪方治飼面方

焚焚石酒和塗之

不過三次

又方搗生菟絲取汁塗之不過三皆盡

治癰瘍方第十八

病源論云人頸邊及胸前腋下自然斑刺點相連  
色微白圓立有烏色者無痛養謂之癰瘍也此是

風耶搏於皮膚而氣不和而生也 和名奈未都波太

葛氏方云面頸忽生白皰狀如癰世名為癰瘍方

以新布指令赤若酒摩巴豆塗之勿墮

又方取生樹木孔中汁拭之未桂且鹽和傳之日三

千金方治癰瘍方

酢摩留黃塗之最上

又方三年酢摩烏賊骨先布摩完赤付之

又方取塗中自死蟣頭搗爛塗之當指令契封一宿老

如意方治癰瘍術

半天河水洗之 又方荷葉上水洗之

搔要方療面上生白駮名癰瘍風方

雄黃流黃礬石已上等分為末百着散方以猪膏和塗之

又方取地脫皮磨之敷過百着散方令熱乃弄之於草中勿及顧

僧深方治癰瘍方

流黃一分 礬石一分 水銀一分 皂黑一分

右四物治末以葱沸和研臨臥以傳上

又方麝香脂敷摩上

又云療身體易斑刺方

女萎二升

附子一枚炮

鷄舌香二升

青木香二升

麝香二升

白芷二升

已上臘月猪膏七合煎

五味令小沸急下去滓內麝香絞調復煮三上三

下膏成磨令小傷以傳之

又方三淋藿灰取汁重淋之洗歷易訖醋研木防

已塗之即愈

又方茵陳蒿兩握

右以水一斗煮取七升先

草薺湯洗歷易令傷然以湯洗之

廣濟方療癰瘍風方



雄黃二兩 白沙二兩 附子二兩 生

右為散 苦酒和如泥塗上

其

經心方治癰瘍方

取屋瓦上癰先拭令赤傳之

龍門方療癰易風方

取皂莢子半外細研和生麻油先用生布揩患  
處後付之良

治白癰方第十九

病源論云面及頸項身體皮肉色變白與肉色不

同患不痛癢謂之白癩此患風邪搏於皮膚而氣不和所生也 和名之良彼太

千金方白癩方

樊石流黃分等末酢和付之

又方酒脹生胡麻油一合日三稍加至五合慎生瘡  
猪鷄屎蒜白日服五升差

又方揩上令破槌羅摩白汁塗之日二塗之取  
差又煮心拭之

新錄方白癩方

鵝常思草汁塗日三

又方鵝杏仁知泥和

鷄子白塗上日二

葛氏方云白癰風一名白癰或謂龍蛇此大難療  
取苦瓠經冬干者穿頭負如錢許以物刺穰  
使漏灌好酢滿中麴封七日先以皂莢葛搯  
使微傷以瓠中汁塗之

錄驗方治白癰方

荷葉野合葉相和更裹皂莢爛先拭令乾傅  
即老

樣要方療白癩膏方

附子三兩 天雄三兩 防風三兩 烏頭三兩

右以猪膏三升煎之傳上

劉涓子方治白癩方

煎

樹穴中水汁向東者乾刮洗白癩二三過即愈  
楓樹勝也

又方生鷄卵一枚內苦酒中淹漬令沒鷄卵殼欲  
消破之先以白傳次以黃傳燦便愈極良

又云療頸及面上白駮浸淫漸長有似癰但無瘡方

右取煖鰯鱣炙炙脂去之塗之先拭駛上外托亂  
之令小煖痛然一更脂塗便愈難者不過三塗之  
治赤痢方第廿

病源論云面及身體及肉變赤与色不同或如牛大  
或如鐵大血不瘡痛謂之赤痢之

千金方治赤痢方

用黑玄大蒜𩚑豆合和付之

又方以銀拭之令契而消不差數拭之乃止

如意方治白痢赤痢術



用竹中水如馬尿者洗之

徐伯方治癰瘡方

獨禿根 九一物苦酒研之塗瘡上立即落

治黑子方第廿一

病源論云黑志者風邪搏血氣變化所生也夫人血氣

死盛則皮膚潤悅不生癰瘡瘡若虛損則點志變

生若生而有之者非藥可治也面及身體生黑點

謂之黑志亦名黑子

錄驗方五灰煎方

石灰 藿灰 桑灰 炭灰 各一升 蓴灰 五升

以水漉蒸令氣逆仍取釜湯淋之取清汁五升許於銅器內東向竈煎之不用鷄猶小兒婦女見之膏成好者如凝強細沙即堪用之  
集驗方去黑子及救貧方

生梨灰五升 石灰二升半 生薑灰五升 生薑

凡三物合令調和差令氣溜下翫取下湯二升從上淋之盡其汁於鐵器中煎減半更閉火煎  
以鷄羽柿中即集新藥成欲去黑子若脫貧

先小傷其上以塗之

如意方治瞻點術

鸕鶿白尿傳之

又方藿灰石灰醇苦酒煎ハ簪塗黑須臾滅去

葛氏方去瞻點方

來灰艾灰各三斗水三石淋取汁重複淋三過

ハ五色帛內中含煎令可丸ハ傳上則爛脫乃ハ

猪膏塗之

千金方疣贅癰瘰方

雄黃 留黃 真珠 礬石 蘆茹 巴豆 射蘆  
各兩 七味為散和合如江塗上枯病上須成瘡  
及去面點皮中紫赤癩痣癰瘰

治疣目方第三

病源謂云人手足邊忽生如豆或如結筋或五箇  
或十箇相連肌裏麤強於內謂之疣目也此是風邪  
搏於肌肉而變生也

葛氏方

以鹽塗疣上令牛舐之不過三

醫心方卷四

下口

又方作艾主如眇大灸上三炷

又方以流黃揩其上三七過佳

又方薤薊赤子按壞刮目上令赤以鹽之即去

千金方

月十五月中時望月以虎條帚掃三七遍

又方栝栢脂合和鹽之一宿失矣

又方取牛涎延發數塗自落

經心方

苦酒漬石灰六七日滴取汁治疣上小作瘡即落



良驗

范汪方

月晦夜於廁前取取故草三七投三七過砂月上  
記祝日今日月晦尤驚或明日月朝朝放了取三人枕  
若席二七拭之愈又方杏人燒令黑研蓬蒿良  
藟散本草注搗馬莧搯之今案信用赤莧良

又方以桑薪灰洗之

又方纏蜘蛛網七日消爛甚効

如意方

取故拂床蓐向青虹咒曰甲患眈<sub>子</sub>就青虹乞  
老青虹沒眈<sub>子</sub>脫意仍送蓐置都路口而還勿反  
顧如此眈目漸消滅

又方雷時以手槌眈擲与雷二七過即脫

### 集驗方

七月七日以大豆合拭疣目上三過訖使病疣目人  
種豆著南向屋東頭第三流中豆生四葉以漿  
湯洗斂疣目便去矣

### 治創癰方第廿三

劉涓子方治諸傷寒盤膏方

衣中白更 鷄尿 白蔞 夕藥 白晝 白鷹矢

右六物分等合乳汁和八涂傷上日三良

極要方鷹矢白下節白蜜和涂三鹽上日三良

本草白瓷凡水摩塗之

新錄方衣更摩上日一

又方胡粉付日一 又方白疆螬末付

又方單用蜜塗之 又方桑白汁和鷄子白塗之

又方榆白皮灰付之又方塗晁暗之

耆婆方胡粉和白蜜傳之



范汪方人精和鷹矢白傳之

醫門方云老極不知瘡象神驗

治胡臭方第廿四

病源論云人腋下臭

腋文

如葱豉之氣者亦言如狐狸

之氣者

故

謂之狐臭也此皆血氣不和蘊積故也

葛氏方云人身身及腋下狀如狐狸氣世謂之

胡臭治之方

宜小便洗腋下

文方炊飢飢及熱丸之拭腋下仍与犬食之七

且如此即愈

又方青木香一斤 石灰半斤 合末垣以粉身  
千金方云有天生臭難治有為人所得者易治也  
凡胡臭人通忌食芸薹五辛治之終身不臭治  
之方

水煎胡粉和鹽之大良驗

又方牛脂胡粉合煎和鹽腋下宿即愈不過兩三  
小品方云治漏腋下及足心掌陰下股裏恒如汗濕  
致臭者六物胡粉膏方



干薑陸兩 干芎朮白皮半兩 干薑半兩 滑石兩

其草半兩 胡粉兩 右六物治末以苦酒和

塗板下發汗書易衣復更著之不過三便愈  
或一歲復發復塗之不可多塗與傷人板也

范汪方同之

靈竒方常以熨石熨未付兩板下

新錄方取白馬尿洗之


又方酢和胡粉塗臍下日一

枕中方治人氣臭方

刃時取井華水口含吐暑瘵中良

經心方取白馬蹄煮取汁拭腋下旦三

又方苦酒和白灰塗燂復易



本草云畏鐵精心熨之

又方鐵屑和酢封腋銅屑又佳

効驗方治腋臭雞舌散

雞舌香二兩 藿香二兩 青木香二兩 胡粉兩

凡四物治下節綿裹於肉腋下押之附須着乃止

范汪方治腋臭方

干薑 白朮 胡粉 白灰 凡四物分等合粉腹下

又方青木香散

青木香兩 附子兩 白灰兩 樊石半兩

凡四物合搗著粉中汁出粉之愈

剛繁論治胡虵方

杜衡 薑本 辛夷 芎藭 細辛各三分 胡粉十分

凡六物吹咀以苦酒并漬煎取三合去滓和胡粉臨卧

腹下

集驗方治胡虵方

車裏細辛五分 青李膏 四物分等搗碎為散粉之  
隨煬帝後宮諸香藥方治腋下臭方

雄黃五分 麝香五分 石硫黃六分 熏丁香五分  
青礬石五分 馬齒草握

右件藥搗和搗熟布兒上曝令乾更搗下篩  
力散以酢漿洗臭處以生布指合破以粉之

醫心方卷第四

羅ハニ弟曰

ナ



醫心方卷第四背記

治白皴令黑方

胡分三兩

研膏

絹巾一敷令盡

二味以榆皮作湯和之如粉粥先以皂莢湯淨洗  
皴令極淨必好干夜卧以藥塗皴上令均託取  
或用荷葉葉綴著頭巾上遍以裹皴一夜至旦取酢  
漿水熱暖三淨洗皴秘方也

白水=酢少分ヲ入具也

以上第五葉

醫心方卷第四背記

--	--	--	--	--	--	--	--	--

醫心方卷第四札記

一頁上 治頭燒舊鈔零本燒下有 三頁下 米汁舊鈔零本

七行 未上有 九 舊鈔零本作益日一二 四頁上 楊

以字 行 五 字之訛後又再訛作五耳 一行 之 舊鈔零本 行 今 和 舊鈔零本 復黃舊鈔零本

四 又云光駿術舊鈔零本作又 五 潤駿舊鈔零本

八 大極舊鈔零本 經日舊鈔零本 土地舊鈔零本

漢魯峻碑王帝作王春秋文七年宋公王臣卒本或作王臣穀梁王臣本或作王臣見釋文蓋古人王王互譌

混 九 佳也舊鈔零本 下一 養止方或同之舊鈔零本

六 枯竭舊鈔零本 九 黃作舊鈔零本 五頁 下三

行九服之舊鈔零本

六頁上 博其石舊鈔零本其石二字作碁一字

行三景地舊鈔零本

五 鬚駿白舊鈔零本白 行注

其毛皆黑舊鈔零本此下有一 行潰脹舊鈔零本

九於駿舊鈔零本 七頁上 一兩煮沸舊鈔零本作

下一范任舊鈔零本 六 日三舊鈔零本 行一外舊鈔

零本一 八頁上 三外碑舊鈔零本 行皆此虫所

作舊鈔零本 五 榮宣舊鈔零本 行術云

無鈔零本 六 丙丁上舊鈔零本 九 苟脰舊鈔零本

據韻會狗戎作狗苟蓋狗之 十一頁 義眉有豪舊鈔

省後文作狗之異構 上三行 零本

作義發

有卷 行四 眉脫 舊鈔零本

行七 青衣 舊鈔零本

行九

眉中无毛

舊鈔零本 上有治字

行下四 好蜜塗

舊鈔零本 下有之字

行六 惡駭

舊鈔零本 駭作毛

行七 以藥

舊鈔零本 下有傳字

行九 弱猪

舊鈔

零本 作拘拍紫

十二頁 上一行 拔去毛

舊鈔零本 無去字

行八 黃藤

舊鈔零本 此下

行下二 故爛帛

舊鈔零本 爛作爛

十三頁 上六行 酒

醉 舊鈔零本

行七 鼓蛇

舊鈔零本 無鼓字

行九 一山

舊鈔零本 一山二字

作三 一字

十四頁 上五行 水銀四分

舊鈔零本 四作二

十五頁 下四行 今細

舊鈔

零本 今

行五 粉澤

舊鈔零本 澤作澤

行八 者更少

舊鈔零本 字作老若二

字疑此句

十六頁 上三行 又方瑤糟汁塗面

舊鈔零本 無此七字

行六

有訛脫



末成

舊鈔零本  
末作未

下三

面及

舊鈔零本  
上有治字

五

查軒蠅

舊鈔零本查

十七頁上

僧深方云

舊鈔零本  
今案二字無云

三行

脹十九

舊鈔零本  
無脹字

五

行酢中

舊鈔零本  
下有漿字

為酢

舊鈔零本  
下有散字

下一

猪膏

舊鈔零本  
無猪字

三

術云

零本無

在面

舊鈔零本  
上有上字

八

行米新

舊鈔零本  
今案時後作

米

十八頁

不過三

舊鈔零本  
無此三字

下六

留黃

舊鈔零本  
留作流

十九頁

已上等分

舊鈔零本  
無已上

六

銀作

電黑

舊鈔零本  
作電墨

七

惹沸

舊鈔零本  
案洪即淨訛

八

脂

九

身體易

舊鈔零本  
易作瘍

下一

鷄舌香二

久青木香二

舊鈔零本二  
久共作一

行三急下

舊鈔零本急  
下有并字

五三淋

舊鈔零本  
作麻一字

廿頁上

龍門方療癰易風方

舊鈔零本

作又方

行下三

白癰

舊鈔零本白  
上有治字

行九白癰

舊鈔零本  
白上有治

字

廿一頁附子三雨

天雄三雨

舊鈔零本三  
雨共作二雨

行三

外

舊鈔零本  
作一外

傳上

舊鈔零本傳  
下有癰字

行又方

舊鈔零本  
無此方

九頰及

舊鈔零本  
頰作頰

廿二頁

北乱

舊鈔零本  
作把刮

行七黑

去

舊鈔零本  
作墨一字

行赤

癰術

舊鈔零本  
術作方

行下三

獨禿根

獨

禿即蓄羊蹄也  
詩言采其蓬釋文云蓬本又作蓄玉篇作董並一音之

轉

八亦名黑子

舊鈔零本此  
下有也字

上九行

集新

舊鈔零  
本集作

壽心方卷四已

三

焦

下二

鑿

鑿 舊鈔零本

鑿 下同

三 白

原 舊鈔零本

原 此下有注云

本 草鷓鴣

夫去黑點

鷓鴣

補添非

舊文也

九

疣 贅 舊鈔

有 疣 上

上六

行

肌

裏 麋 強 於 肉

舊鈔零本

作 肌

下 九

須 石 灰

舊鈔零本

活 泥 上

舊鈔零本

治 字

謂 以 汁

上 也

上三

行

砂 目 上

舊鈔零本

記 作

朝 了 零 本

作 朔

崇 隋 陳 叔 毅

廟 碑 朔 作 朝

亡 人

舊鈔零本

八

行 蜘蛛 網 舊鈔

零 本 網 上

下二

意 乃

舊鈔零本

上六

行

諸 傷 零 本

有 細 字

五

白 瓷 凡 水

舊鈔零本

下二

行

醫 門 方 舊鈔零本

有 今 案

九

行

飢 飢 舊鈔零本

上六

行

水 銀 舊鈔零本

八漏板下舊鈔零本

九六物舊鈔零本

行下四

復舊鈔零本

行白馬尿舊鈔零本

下八頁青木香

二兩舊鈔零本

行臨卧舊鈔零本

上三頁熏六

香舊鈔零本

行青焚石舊鈔零本

行五書兒上舊鈔

沱舊鈔零本

行青焚石舊鈔零本

行五書兒上舊鈔

本卷接紙凡十七葉每葉有二草字字體難辨識或疑尚鞠局用此為記號歟是未可知也姑闕疑

焉





醫心方卷第五

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治耳聾方第一

治耳鳴方第二

治耳卒痛方第三

治耳方第四

治耳肝脾方第五

治百虫入耳方第六

治吳公耳方第七

治蜘蛛入耳方第八

治蟻入耳方第九

治飛蛾入耳方第十

治水入耳方第十一

治耳中有物不聽方第十二

治目不明方第十三

治目清盲方第十四

治雀盲方第十五

治目膚翳方第十六

治目赤白膜方第十七

治目息客方第十八

治目珠管方第十九

治目珠子脫出方第二十

治目腫痛方第二十一

治目赤痛方第廿二

治目胎赤方第廿三

治目痒痛方第廿四

治目赤爛眦方第廿五

治目淚出方第廿六

治目為物所中<sub>アチ</sub>方第廿七

治竹木刺目<sub>セ風</sub>方第廿八

治稻麦芒<sub>アノヤシ</sub>方第廿九

治芒草沙石<sub>アノヤシ</sub>方第卅

治鼻塞涕出<sub>フサカリ</sub>方第卅一

治鼻中瘰肉<sub>シノコヒタル</sub>方第卅二

治鼻中生瘡<sub>ハナナ</sub>方第卅三

治鼻痛方第卅四

治鼻中<sub>カクキ</sub>方第卅五

治鼻衄<sub>ハナナ</sub>方第卅六

治鼻中物入方第卅七

治堅<sub>クチヒル</sub>膚瘡<sub>ウケタル</sub>方第卅八

治<sub>セキ</sub>膚生核<sub>セキ</sub>方第卅九

治<sub>カクキ</sub>膚黑腫硬<sub>カクキ</sub>方第卅

治<sub>カクキ</sub>膚<sub>カクキ</sub>灼破<sub>カクキ</sub>方第卅一

治<sub>カクキ</sub>膚面<sub>カクキ</sub>腫<sub>カクキ</sub>方第卅二

治口舌生<sub>カクキ</sub>瘡<sub>カクキ</sub>方第卅三

治口舌<sub>カクキ</sub>血出<sub>カクキ</sub>方第卅四

治九竅<sub>カクキ</sub>四支<sub>カクキ</sub>血出<sub>カクキ</sub>方第卅五

治<sub>カクキ</sub>歐<sub>カクキ</sub>血<sub>カクキ</sub>方第卅六

治<sub>カクキ</sub>吐<sub>カクキ</sub>血<sub>カクキ</sub>方第卅七

治<sub>カクキ</sub>唾<sub>カクキ</sub>血<sub>カクキ</sub>方第卅八

治口中爛痛方第卅九  
治口吻瘡方第五十  
治口舌乾燥方第五十

治口臭方第五十二  
治張口不合方第五十三  
治舌腫強方第五十四

治重舌方第五十五  
治懸癰長方第五十六  
治風齒痛方第五十七

治齩齒痛方第五十八  
治齒碎憊方第五十九  
治齒令堅方第六十

治齒動欲脫方第六十一  
治齒黃黑方第六十二  
治齒敗臭方第六十三

治齒斷腫方第六十四  
治齒斷間血出方第六十五  
治牙齒痛方第六十六

治牙齒後涌血方第六十七  
治齒斷方第六十八  
治齩齒方第六十九

治喉痺方第七十  
治馬痺方第七十一  
治喉腫痛方第七十二

治尸咽方第七十三  
治咽中肉實方第七十四

治耳聾方第一

時忌多

病酒論云耳聾者腎為足少陰之經而藏精其氣

通耳宗脉之所聚也若精氣調和則腎藏強盛耳

聞五音若勞傷血氣魚受風邪損於腎氣而精脫者

則耳聾今案大素經云人有手足少陽太陽及手陽明五脉皆入耳中故曰宗脉所聚之也養生方云

勿塞故井及水瀆令人耳聾目昏葛氏方云聾有

五種風聾者掣痛勞聾者黃汁出乾聾者肝膽生虛

聾者作聲亭聾者膿汁出治之方

鯉魚脰魚以竹筍盛

蒸之炊下氣以灌耳綿塞莫動半日乃拔塞用膳



良薑畢塞耳

今案范汪方鯉腦竹筒盛塞頭遂令

又方桑

掌後第二橫文中央隨聾在右依年壯

又方伏翼肉

耳中甚良腦中血尤妙

又方鼯腦綿裹內中良

今案博濟

安衆方取猫傷了鼯膽一枚側卧應耳中一兩度即死

千金方治耳聾方綿裹蛇膏

塞耳神良

又方雄黃流黃分末綿裹塞數日間

又方

作泥餅厚薄如餅飽覆耳上四邊勿令泄氣當耳孔上

草刺泥餅穿作小孔灸孔上二百壯推耳痛不可忍即

心側耳寫却黃汁出盡即老當灸特若泥于數易之

小品方治耳聾方巴豆十四枚去心皮

松脂半兩練去



澤凡二物合セ搗取如黍米粒大著ツケ簪頭著耳中風

龍耳ハ即愈勞聾ハ當汁出蟻後乃愈ハ數用有驗今案醫門

方綿裹塞耳日一場又方灸聽會穴在耳前陷中

范汪方治耳聾方鷄子一枚漬苦酒七日塞耳當取其

汁用注中神良又方以淳苦酒微煎附子五六宿削

令可入耳中裹以絮塞耳

新錄方玄治耳聾方雀腦綿裹如杏人塞耳中日一場

又方生地黄煨軟綿裹塞耳又方煨石上昌蒲塞耳

錄驗方玄昌蒲散治耳聾方昌蒲附子分等下篩以酒和如棗

校綿裹卧時塞耳夜易之十日愈今案博濟安衆方昌蒲二兩附子兩

効驗方杏人丸治耳聾方杏人十分桂二份和丸如

鼯矢綿裹塞耳中日三又玄昌蒲丸方昌蒲根一寸

巴豆一枚去心皮凡二物搗合分作七丸綿裹如大豆塞耳

中朝一夕一良

槎要方療卅年聾方杏人亭慙塩等分以猪脂煎綿裹

裹塞耳良驗救急單驗方療耳聾方搗鵝膏歷耳中

治耳鳴方第二

病洎論玄耳者宗脉之所聚宗脉虛則風耶無虛隨

醫心方卷五

脉入耳与氣相擊故為耳鳴 千金方治耳鳴如流

水聲不治又成龍耳方 生烏頭オウ莖シ附子附子名也如棗核大塞耳

日一夜一易カフ不過三日愈ル名治癢及風聾 小品方治風

聾耳中鳴方 但用鯉魚脰竹筒盛塞頭モリ差令痒冷

以灌耳即愈 又方附子昌蒲ル分木槁以綿裹塞兩耳

甚良 葛氏方玄耳中恒鳴方 生地黃切斷仍以塞

之日夜數十易急治龍耳 又玄卒得風耳中乳乳也者

方 急取塩七升甑中蒸使契以耳枕塩上冷易之

治耳卒痛方第三

宗欽

病洎論云凡患耳中榮痛者皆是風入於腎之經也

葛氏方治耳疼痛方ヒラキ又云痛有汁出者方ヒラキ葵アヲ活イ

人令赤里煎搗如膏丁カキ赤穀コメ裹塞耳日二三易今案樣要方杏人三兩三

日愈又云耳卒腫出膿者方未樊石著ホシ管中吹ツキ醫門方治入耳三四過當愈

耳痛方昌蒲附子ラシ分等末以爲麻油和如泥取如分

豆灌耳中立愈今案龍門方綿裹塞

治臍耳方第四

病洎論云耳者宗脉之所聚腎氣之所通ナリ是少陰腎之

經也勞傷血氣風熱乘虛入經其血氣至耳熱氣聚



則生膿汁謂之聤耳也 葛氏方聤耳痛膿血出方

カキハチ釜月下灰吹滿耳令深入无苦即自丸出 又方搗桂以

巢膏和塞耳不過三四 又方桃人煎搗以赤穀裹塞

耳中 今治平無出注在聤耳家本 今案博濟安衆方 小品方治聤耳出膿汁散方 樊石

三兩燒令汁盡黃連一兩為賊骨一兩

石三物搗治下篩如棗核大綿裹塞耳日二

又云耳中膿血出作亭耳治之不愈是有虫也治之方

鯉魚腸一具細剉之以麝三升合搗布裹以塞兩耳食

項當聞痛則者應有白虫出看藥仍去故藥更



療耳

著新者須<sup>下</sup>虫盡乃<sup>ハ</sup>心<sup>ヤ</sup>千金方同之博濟安衆方漏在巢出

膿<sup>ハ</sup>杏仁炒令赤搏如膏綿裹塞耳中<sup>ハ</sup>又方細辛末

附子末以葱涕和灌耳中<sup>ハ</sup>又方松脂為末挑女身中

每安極炒<sup>ハ</sup>又方石首魚腦中枕子為末安耳中

華他方治亭耳方<sup>ハ</sup>雄黃樊石分<sup>ハ</sup>末<sup>ハ</sup>以綿纏筋頭枝膿

如大豆著耳中濕者以藥傳之<sup>ハ</sup>廣洛方瘡亭耳膿血

出方<sup>ハ</sup>取車輪脂塞耳中出膿血愈<sup>ハ</sup>槎要方瘡亭

耳出膿水方<sup>ハ</sup>白樊<sup>ハ</sup>一分燒令沸白龍骨<sup>ハ</sup>一分為賊<sup>ハ</sup>臭骨一

分<sup>ハ</sup>補黃<sup>ハ</sup>二分

醫心方卷五

此方治  
本元  
重基本  
有  
二室本  
元

右為散綿裹イル內耳中イル日夜ル五遍ル於耳中イル著十日

內必著 救急單驗方療イル癰耳膿血出方

取成練白礬石如小豆內耳中不過三著 錄驗方治耳

中痛膿血出昌補散方

樹二兩 當歸二兩 薑二兩 昌補二兩 附子二兩

凡五物治令下篩綿裹塞耳孔時々易之

治耳アツク肝脾方第五

病洎論云耳肝脾者是耳裏津液結聚ナホ而成人耳皆有

之輕者不能為心若加以風熱乘之則結鞭成カク九核塞

耳亦聽耳暴聾三分二葛氏方治肝脾寒耳而強堅不可

得桃出方キコル鳩曲蛭蚘取汁以灌耳中不過數灌槩之皆

出千金方  
固之

### 治百虫入耳方第六

葛氏方治百虫入耳方以好苦酒漬樹灌之以起行便出

又方綿裹猪肪塞耳イラウ須臾虫死出著綿又方用氣令人以

蘆管吹耳又方鳩生薑汁灌之モ韭汁モ佳又方以雨

刀於耳前相敲ナセ作聲虫即出又方溫湯令ホ的ホ以灌之又方

燒干顛頭屑ヒケルナミツ綿裹塞耳立出又方以草帶鈎向耳孔即

諸虫皆出令釣羅耳孔中内虫即耳中カキ 小品方虫

入耳者方取樹一撮末之以半升酢漿漬取汁温灌ヒタス

耳中行十四步虫步虫則出又方醬苦酒漿汁灌之アルケント

又方綿裹白膏耳虫則死著綿出又方用車轂脂塗クマツラフ

耳孔虫則出槌要方百虫入耳方以苦酒灌之

又方生薑汁灌之又方薤汁亦佳千金方虫入耳方薑

桃葉塞耳立出又方以葱涕灌耳即出大驗又方車トコロ

軋脂塗耳孔虫自出范汪方虫入耳方永根如大豆量キヲ

耳中須臾令耳向下以銅物擊齒數十即出又方鵠シメ



藏

識菜以汁灌之ナカ 新録方治虫入耳方 干薑末吹耳

中出 又方綿裹銅屑塞耳ウラキス 龍門方瘡百虫入耳方

焚胡麻以踈布裹作枕イリ 頭即出アラキ 又方銅器近耳邊チカキ

打作聲即出ナセハ

治吳公入耳方第七ムカチ

葛氏方吳公入耳方 取新熟牝犬ヌ 若多猪ヲ 犬以當耳オホハ

孔中安之即出ヤルクシテ 醫門方治吳公入耳方 炙猪肉令香掩オホハ

耳立出千金方 槌要方治吳公入耳方以柝葉裹塩炙ハシカア

令契以掩耳アタカミシハ 冷即易立驗ヒヤシ

吳公入耳方



治蚰蜒入耳方第八

葛氏方云蚰蜒者世呼為土蟧似吳公黃色而細長治入

耳方以水銀如大豆一枚置耳中又方焚胡麻以葛囊盛

枕之虫聞香覺出即著今茶醫門方擣碎用之小品方治蚰蜒入耳

方炒麻子葛囊盛之傾耳枕之虫聞香則出槌要

方治蚰蜒入耳方灌油即出又方桃葉汁灌之

又方銅器近耳邊即出今茶醫門方打作聲千金方治蚰蜒入耳方牛乳灌之

治蟻入耳方第九

葛氏方治蟻入耳方炙脂膏香物安耳孔邊則自

又方燒溪鯉甲末水和灌耳中アツシ  
出。龍門方云耳邊灸宗即出 醫門方云以猪頭炙

令香安孔邊立出

治飛蛾入耳中方第十

葛氏方治飛蛾入耳中方 以葦管吹之立走出

治水入耳方第十一

新錄方治水入耳方 取魚目為灰イルシハ內水中便出 龍門

方治水入耳方 取水銀豆許安耳邊水出

治耳中有物不出方第十二

千金方云耳中有物不可出方以麻紙以紙及冠上膏復也一頭令散塗好膠

柱<sup>フセキツヤ</sup>著耳中物令上傳之令相著徐<sup>ヒケハ</sup>引之令出

治目不明方第十三

病洎論云夫目者五藏六府陰陽精氣皆上注<sup>ノホチイル</sup>於目若

為風耶<sup>シハ</sup>而侵<sup>シハ</sup>則令目暗<sup>ツラカラ</sup>不明也養生方云恣樂傷魂

通<sup>ツ</sup>於目極<sup>ツ</sup>肝則目暗<sup>ツラカラ</sup>新邵服石論云凡洗頭勿使頭

垢<sup>アカ</sup>汁入目中令人目痛新邵服石論云凡洗頭勿使頭垢

汁入目中令人目痛養生要集云以冷水洗目引<sup>ヒ</sup>熱氣

令人目早<sup>クラカラ</sup>瞑治眼方云治眼七病一傷<sup>ル</sup>於房精氣虛竭二傷

大風三傷於大寒四傷於大熱五傷於毒病六傷於熱

病時勢盛損於肝氣七傷大勞肝氣衰疲皆令眼不明或

生膚翳或時苦疼痛或但冥无所見治之方決明子モロヘニ

四分車前子オホハコ六分白木子モロヘニ六分地膚子ニクモノアキモ六分細辛アラネモノクヤナモクハ四分

栢子ヒツア六分防風フセムカノ六分蜀椒フセムカノ六分一方四分

凡八物下篩服方寸匕日三百日後眼疾除遠親明視

又云治眼失精一歲二歲至三四歲或目中無他病但无所

見如翳中視決明散方馬蹄アハヒ決明二斗凡一物治下

從以粥清服方寸匕日三禁食生魚猪犬辛菜

葛氏方治目失明廿年不識人鍾乳雲母散方



鍾乳四分

伏苓四分

遠志四分

細辛四分

雲母四分

右五物

下篩

為散

服半錢

上稍增至一錢

又云治目瞶不明方

決明子一分

薤白一分

黃連二分

秦皮二分

右四物切以水八合煎取三合

治綿洗目中

又方三歲雄雞冠血數

傳之自老

大唐延年方治目

茫々無所見

蕪菁散方

蕪菁子小二升

以水一大斗

煮取令盡汁出

日干熬散

練胡麻小三升

熬為散

治合以飲

若酒服之

小品方治目卒

不見方

以洗目

日三

葛氏方

千金方神麴丸

主明目

一百歲

五二二

鍾乳

伏苓

遠志

細辛

雲母

右五物

下篩

為散

服半錢

上稍增至一錢

又云治目瞶不明方

決明子一分

薤白一分

黃連二分

秦皮二分

右四物切以水八合煎取三合

治綿洗目中

又方三歲雄雞冠血數

傳之自老

大唐延年方治目

茫々無所見

蕪菁散方

蕪菁子小二升

以水一大斗

煮取令盡汁出

日干熬散

練胡麻小三升

熬為散

治合以飲

若酒服之

小品方治目卒

不見方

以洗目

日三

葛氏方

千金方神麴丸

主明目

一百歲





夫二百壯唯多為佳至驗不須方藥 錄驗方黃連太一

九治肝氣熱衝目令視瞻膜方 黃連二斤

凡一物以好清酒一升淹一宿出曝之干復內酒中如是十

過酒盡為度乾搗篩蜜和丸如梧子一服七九日每禁猪魚

犬馬鷄犬五辛生冷餘依藥治 藕敬本草注云搗絞

地膚汁洗之 今案錄方搗篩酒 范注方治目冥茫方

蕤核三分 黃連二分干薑 細辛各一分 凡四物咬咀

蜜三合水三合漬之一宿剪得二合如米注目日三而集驗方

治目不明若淚出方 用為鷄膽臨眠傳之良又方櫛

小酸模<sup>シメネ</sup>差汁<sup>サ</sup>注<sup>イル</sup>四<sup>ハナ</sup>眚<sup>シ</sup>數<sup>ス</sup>為<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>僧深方<sup>ニ</sup>治<sup>ル</sup>目<sup>メ</sup>昏<sup>ヒ</sup>十<sup>ト</sup>歲<sup>セ</sup>百<sup>ヒ</sup>醫

不能<sup>ズ</sup>治<sup>ル</sup>鬱<sup>ウツ</sup>金<sup>キン</sup>散<sup>サン</sup>方<sup>ハ</sup>鬱<sup>ウツ</sup>金<sup>キン</sup>二<sup>ニ</sup>兩<sup>リョウ</sup>黃<sup>ワウ</sup>連<sup>レン</sup>二<sup>ニ</sup>兩<sup>リョウ</sup>樊<sup>ハン</sup>石<sup>シツ</sup>二<sup>ニ</sup>兩<sup>リョウ</sup>

凡<sup>ソレ</sup>三<sup>サン</sup>物<sup>モノ</sup>治<sup>ル</sup>令<sup>ニ</sup>歸<sup>ル</sup>卧<sup>シ</sup>時<sup>トキ</sup>著<sup>ツク</sup>目<sup>メ</sup>中<sup>ナカ</sup>如<sup>ニ</sup>來<sup>ル</sup>米<sup>メ</sup>旦<sup>タン</sup><sup>ヒ</sup>

治<sup>ル</sup>目<sup>メ</sup>清<sup>アキ</sup>昏<sup>ヒ</sup>方<sup>ハ</sup>第<sup>ニ</sup>十<sup>シ</sup>四<sup>シ</sup>

病源論云清昏者謂眼本无異瞳子黑白分明<sup>オトモ</sup>直<sup>ナ</sup>不<sup>レ</sup>見<sup>ル</sup>物

耳若藏<sup>ナ</sup>虛有風耶淡飲<sup>ニ</sup>乘<sup>ル</sup>之有<sup>ニ</sup>契<sup>セ</sup>則<sup>ニ</sup>赤<sup>セ</sup>痛<sup>シ</sup>无<sup>レ</sup>契<sup>セ</sup>但<sup>ニ</sup>内<sup>ニ</sup>

生<sup>ナ</sup>鄭<sup>シ</sup>是<sup>ニ</sup>府藏<sup>ニ</sup>血氣<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>榮<sup>ル</sup>於<sup>ニ</sup>精<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>狀<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>異<sup>シ</sup>只<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>見<sup>ル</sup>物<sup>ニ</sup>也<sup>ナ</sup>

即謂之清昏眼論云夫人苦眼無<sup>ニ</sup>兩<sup>ニ</sup>目<sup>ニ</sup>起<sup>ル</sup>忽<sup>ニ</sup>然<sup>ニ</sup>幕<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>痛<sup>シ</sup><sup>イシカラ</sup>

不<sup>レ</sup>痒<sup>シ</sup>漸<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>明<sup>シ</sup>經<sup>ニ</sup>歷<sup>ニ</sup>年<sup>ニ</sup>歲<sup>ニ</sup>遂<sup>ニ</sup>致<sup>ル</sup>朱<sup>シ</sup>明<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>觀<sup>ル</sup>容<sup>ニ</sup>狀<sup>ニ</sup>眼<sup>ニ</sup>形<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>

異唯正當眼中中央小瞳子裏乃有鄣（アサナ）。瞳子作青白色雅  
不別人物要猶見三光知晝知夜如此者名曰清盲此宜用  
金錐決之（七ル）針便豁（クネ）然若雲用見日也針竟便服木黃丸不宜  
大泄疾（此）皆從虛熱垂風所作也又云夫清盲之為病發在  
於內有鄣狀似凝膏大如楮子浮在眼內游向水中正鄣  
瞳子既在眼裏散藥膏剪（モ）而不及愚賢無知謂呼  
在外或傳翳散（ハナ）或復掃刮（シ）假道虛談託辭（妄）忌說（徒）後施  
千方竟不収一難復盧賢起骨華他解聰（モ）此皆偏學一  
邊各善一術至於清盲內鄣則自拱手治眼方治眼清



盲无所見斑浮鳩散方斑浮鳩二頭

治如食法  
多令藥

决明子半升

細辛二兩

防風二兩

凡四物吹咀合封十五日乾之治下後酒

服方寸匕日三夜二又治清盲无所見卅羊方細辛

螢火十二枚蕪菁子一升鯉魚膽三枚凡四物治蕪菁子鯉

螢火下後以魚膽和之不足人乳汁益之服如梧子三

九七日知十五日愈又方猪膽一枚凡一物微火上煎之

令可丸以如黍米内眼中食頃有驗此方治生翳宜

少傳不可過多耆婆方治人目清盲晝夜不見

物方秦皮トネリコ升麻トリフアシクセ黄芩ヒトウキ分等以水三升煮取半治綿



付目中 小品方目清旨无所見方 以赤鯀莫膽并

腦難<sup>ナシ</sup>真朱合和綿<sup>モ</sup>取注皆中

治雀<sup>トリメ</sup>旨方第十五

病源論云人有畫<sup>ヒル</sup>而精明至暮則不見物世謂之為雀

目言如鳥雀无所見也 千金方治雀目術 至黃昏

時看雀宿處打驚之雀起飛乃咒曰紫公我還

汝旨汝還我明如此三日瞑三過<sup>ル</sup>為<sup>シ</sup>之明眼也 葛氏

方治雀旨方 以生雀頭血<sup>コ</sup>傳<sup>グ</sup>目可<sup>ル</sup>比<sup>ニ</sup>夕<sup>ニ</sup>作<sup>ラ</sup>之 又方最

膽<sup>イ</sup>傳<sup>イ</sup>之最良 新錄單方治雀旨方 鯀<sup>イ</sup>莫<sup>イ</sup>膽<sup>イ</sup>并

膽付如粟並良

今案葛氏方  
鯁膽若傳腦

者婆方治雀盲方 取

猪肝去上白幕切作膽以淡薑鹽三朝空腹食之

老

錄驗方治雀盲方

小蒜一升改咀以水四升煮令蒜熟著小口

器中以目極上當小室可無苦

治目膚翳方第六

病酒論云陰陽之氣皆注於目若風耶淡氣垂於府

藏之氣虛實不調故氣衝於目久不散變生膚翳

膚翳者明眼精上有物如蠅翅者是也 眼論云若

目時病後眼痛生翳此為翳也若目病後生赤

者此為膚翳也 又云若已生翳者當鑊之其中有

赤脉處當以鈎<sub>ニ</sub>甘刀<sub>ヲ</sub>割<sub>リ</sub>斷也日<sub>ニ</sub>針鍾傳<sub>ハク</sub>散若鈎<sub>モ</sub>割

必當就<sub>ツク</sub>白中勿就黑中也里<sub>モ</sub>處輕薄動致傷破水出

也若黑上有翳<sub>ヒ</sub>積經年月過厚者多少綴<sub>セ</sub>鈎<sub>ニ</sub>之亦

非嫌也若始患翳<sub>ヒ</sub>五三日者<sub>ニル</sub>雅復極厚狀似聚膏

不勞鈎之則更甚若赤<sub>ニ</sub>宗膚<sub>ヲ</sub>鄣始起骨頭當鈎<sub>ニ</sub>割去之

若赤<sub>ニ</sub>宗生上<sub>ニ</sub>爲<sub>シ</sub>珠者<sub>ニ</sub>當就<sub>ツク</sub>白中鈎<sub>ニ</sub>之<sub>セ</sub>逼近<sub>ニ</sub>黑<sub>ニ</sub>邊<sub>ニ</sub>割<sub>リ</sub>斷

向自去之也勿侵<sub>ニ</sub>焉<sub>ヲ</sub>上恐<sub>ニ</sub>脫傷損<sub>ニ</sub>若患赤<sub>ニ</sub>宗積<sub>ニ</sub>經多年

鈎<sub>ニ</sub>之當以<sub>ニ</sub>蘆力<sub>ヲ</sub>割<sub>リ</sub>之勿用<sub>ニ</sub>甘刀<sub>ヲ</sub>隨生不住<sub>ト</sub>割<sub>リ</sub>竟當<sub>ニ</sub>

傳<sub>ハク</sub>地骨<sub>ニ</sub>珠<sub>ニ</sub>沙散<sub>ニ</sub>時傳<sub>ハク</sub>石膽<sub>ニ</sub>割<sub>リ</sub>竟仍以<sub>ニ</sub>火<sub>ヲ</sub>針子<sub>ニ</sub>柱<sub>ニ</sub>

之令折其生勢也若眼中無過郵翳而漠々遠視不明  
當鈎眼本皆頭赤赤割去之良 治眼方治眼急生膚  
翳及赤赤上黑精上眼此馮肝湯方

貴苓二兩 ヒシキ 芍藥二兩 岸消一兩 甘草一兩半 太黃二兩

大棗十二枚 凡六物以水六升煮取二升五合分三服

又方卧時以胡粉注翳上治卅年翳甚良 又云眼中

牽生膚霞童子赤白者塩散傳方 塩一銖 頭垢一

銖 干薑一銖 凡三物塩燒合治取如小豆大暑眼中不過

二 又云胡粉散治眼卒冥及生翳方 胡粉一銖 干



薑一銖 凡二物末之以筒吹少々著眼中大良又治眼

中生息并白赤鄣翳散方 貝齒一分真朱一分

凡二物治下後凡取如小豆著翳上病人正你眼他人

与之可再三經一食久拭之神良 今葉小品方見又去治眼

生淫膚覆童子<sup>（ルシ）</sup>上方 随眼痛<sup>キ</sup>左右炙眉當中童子

七壯便愈 葛氏方治卒生翳方 炙牛大指節上橫

理三壯<sup>（ハ）</sup>左右炙<sup>（ハ）</sup>目灸左又方燒貝齒細篩作卧令人

以著翳上日二三時拭去 千金方治目翳方雄雀矢人

乳汁煎和傅<sup>（ツ）</sup>上自消爛壞盡 僧深方治目白翳



方牝<sup>シラミツカヒ</sup>癰<sup>シラミツカヒ</sup>爲賊巢骨分等下篩以粉目日三之可治馬

翳又方者<sup>ニテ</sup>露蜂房以汁洗之數々洗良<sup>ハ</sup> 范汪方治

目有翳卒生翳方 取書中白<sup>シアラ</sup>巢<sup>セラシ</sup>曝令干未少々注翳

上一注便愈 又方搗<sup>ツク</sup>枳<sup>ツク</sup>汁洗翳上日五六良 錄驗

方治目翳干薑散方 干薑雄黃分末下篩取如米著々

翳上日二 集驗方治白翳<sup>シ</sup>覆瞳子黑精龍骨散方

龍骨一分貝齒三枚<sup>焼</sup> 礬石一分<sup>焼</sup> 凡三物下篩<sup>治</sup>著<sup>アケリ</sup>背頭

日二 崔禹錫食經玄内<sup>オウ</sup>鴛<sup>オウ</sup>鴦<sup>オウ</sup>肪良<sup>ヤラフ</sup> 槌要方云記

日有三人眼後膚肉生前霞黑童子上使割之三日輒<sup>凡六千</sup>

復生不可心有取小釘燒令赤燂ヤカ膚上不過三燂ヤカ膚

縮ハツ愈前後治廿一人皆愈

治目赤白膜方第廿

治眼方治目平生膚翳赤白幕方取薤白ニラノクサ弱刀截ハ注イル

膚上注之イルシハ其便周遍幕皆著薤頭ハシ去眼不耐辛不

過得再三注也又云治目白膜覆童子無所見方以鯉魚膽

塗鐵鏡面一宿令干刮取之カキ曝干末塗目翳上日再鑿カシツクリ

葛氏方治目契生淫膚赤白膜方取生依牛一枚去其

厥內朱於中著火上令沸綿注取以傳背中又方取

雀矢細直者以人乳和傅膜上目消爛盡也又方搗槁  
杞汁洗之目五六集驗方同之

治目息宗方第十八

病源論云息宗淫膚者此由耶契在藏薰於目契氣

加於血脉蘊積不散結而成息宗葛氏方治目中生宗

稍長欲滿目及生珠管方搗貝齒絹從鼻丹分等攪

令和以注宗上目三四廣利方理目久風赤生息肉痛用

不得方黃連八分碎大棗肉四分竹葉兩握切蜜半合

切以水二大升先煎竹葉取一大升去竹葉下棗肉黃連

蜜半合剪取四合去滓カレ更瀉シタム去泥重剪如稀錫カキアス夜即

點眼中三五滴ハシタ目動也貶眼中令藥入今茶那繁論

蘘敬本草注云雀矢和首生男乳如泥點目中怒赤

脉貫ツラスケル上腫子者即消神効

治目珠管方第十九

病源論云目珠管者風熱淚飲積於藏府使肝藏血氣

滯積衝發於眼津液變生結聚狀如珠管也 范汪方

治目卒生珠管方

以蜜塗目中作卧須臾當汁出随拭去之半日乃可



添之生蜜尤良 又方鯉魚若鱖魚ツナ膽注背中以少

真丹和膽傳尤佳

千金方治目生珠管方

唐冷石

羊爪甲

龍骨

三味分等末ツツ為散以新筆著上日三 葛氏方治目

卒生珠管方 鵠牛オウゴン膝根葉取汁以洗目ハモ名目中佳

治目珠子脫出方第廿

病酒論云風熱痰飲積府藏則陰陽不和肝氣滯積

生熱衝於目使目精疼痛熱氣衝擊其珠子故令脫出

也 治眼方目卒珠子脫出及青翳方 越鶯ハクラン矢一分



真丹一分于薑一分

凡三物搗ユツカニ細末以管吹フケハイワキ痛上即愈

今案本草越鷺紫也胃輕小也胡鷺胃

斑里聲大也

醫門方眼睛無故突出二三寸者方 急以冷水灌漬眼中

數カク易水須臾晴當自入平復如故也

治眼腫痛方第廿一

眼論云若初患眼腫痛者不可以物薄熨之勢恐熱歸裏

當時雖好久而不佳深可慎之涼治眼方治眼腫痛方 大黃

八兩以水五升漬之ヒタシ一宿明旦絞取汁分二服又方以酢漿

作塩湯洗之日可<sup>分</sup>十及又方秦皮二兩 黃連二兩

苦竹葉切一升 <sup>カハクテツハ</sup>以水二升煮取七合洗眼也 又云治眼暴天

行風腫痒痛方 <sup>ソコウカハ</sup>地骨白皮三斤 水三斗煮取三升

絞去滓 <sup>カレ</sup>更内塩二合取煎二升傳目也或加乾薑二兩

又云治眼風腫痒痛方 <sup>ハレカナ</sup>防風二兩地骨白皮 <sup>ニ</sup>兩 細辛二兩

乾薑二兩 <sup>シ</sup>水煮取七合洗眼 又云治酒後熱毒腫痛

方 支子人 <sup>クナナシツセネ</sup>一升 <sup>フセリ</sup>苾胡三兩 <sup>シライシ</sup>石膏三兩 芫青二兩 大黃二

兩 黃芩一兩 黃甘草二兩以水五升煮取升半洗眼

治目赤痛方第廿二

病洎論云目赤痛俟肝氣通於目言肝氣有熱衝於目

故令赤也 眼論云治眼赤痛<sup>ヒシクヤ</sup>不得用方 鯉魚膽一枚

黃連二枚 凡二物合和淹<sup>ヒシクヤ</sup>於二斗米下煮之飯<sup>ヒシクヤ</sup>喫

去滓塗目皆立愈

又云治眼卒掣痛方 冬當童子上行入髮際一寸七壯

痛即止兩眼痛冬雨眼處甚良

又云治目中白精赤如血支子煎方 黃連一兩下篩肥支子<sup>シチナラウセネ</sup>

中人二分<sup>研</sup>二物研如上法和以鷄子黃如泥更<sup>コク</sup>就<sup>コカニ</sup>研

絹紋去滓用注目目七八鷄子易<sup>クセリ</sup>夏唯臨時看目和

少々用而已勿遂和之

博濟安衆方治赤眼腫痛熱淚下驗方

黃連爲末綿裹以耳蔗汁浸良久點之

治本元熱方秘傳本有

又玄契毒風攻兩眼并臉<sub>ミタラ</sub>忽浮腫眼赤復欲上怒肉等方

里立<sub>豆</sub>一升<sub>樽</sub>

右分作十分將軟綿帛子逐分裹於沸

庄陷及入物内水也

湯内蘊過承契慢々慰之每分三度入湯盡其十分

即消愈

又玄治積年風赤眼方

右取長明燈油<sub>ツ</sub>盞<sub>ツ</sub>內油少許

以一銅錢於霜鉢<sub>チヤウハツ</sub>內細々磨之令油凝鉢底覆却以艾

烟薇、董之一夜以鋼筋點極驗

葛氏方治目卒赤痛方

搗薺菜根ナナ以汁洗之又方當

灸耳輪上七壯又方鷄舌三七枚

黃連二兩 大葉一枚

右三物切以水一升煮取三合先以冷水洗滌綿拭目

日三大良

大竹又吳竹

千金方治目赤痛方

甘竹葉三七枚

烏梅三枚 古錢三文

凡三味水二升モ

先漬藥半日東向煮三沸三上三下得

二合注目眦

范汪方治目赤痛方

干薑二分 黃連四分

凡二物治合已



乳汁和如黍米注四眥晝夜无丽在

又方黃連一兩 丁香<sup>廿枚</sup> 以水八合漬之三日去滓洗眼  
小品方<sup>治</sup>目痛方以鹽湯洗之良 又方以<sup>アヤノカウ</sup>蕤荷根取汁

暑竹筒中著目中即愈

錄驗方治目赤痛黃連湯方<sup>黃連二分 大棗十枚</sup>

凡二物切以水五合煮取一合半注目中日十夜二

者耆婆方<sup>治</sup>又眼赤痛方 秦皮二兩 升麻三兩 黃連二兩

三味以水三升煮取二升去滓少少內目中洗之

集驗方治目痛<sup>廿年</sup>方 取虫螺<sup>シビ</sup>一枚以水洗之內燂杯

中使螺口用黃連一枚內螺口中螺飲黃連連苦螺吐汁以

綿注骨中

治目胎赤方第廿三

龍門方療大赤眼胎赤方以繩從頂旋量至前髮際中

屈繩頭灸三百炷炷驗又方青荊荊燒令出汁點眼骨驗

廣濟方療目赤痛及胎赤方以蚌蚌蛤蛤果果量蜜二分

綠塩唐一分和夜卧時火灸煖著目骨三四日愈又方猪

膽和綠塩傳アリ之効

治目痒痛方第廿四

療眼方治目茫々痛痒滂出方 用新熟米酒心作面卧  
以酒灌目令滿便急閉目須臾開之別使年少明目人看  
視虫當出似細繩如毛刮出浮塩水中重者七八枚輕  
者或二三十枚出能數作出盡自愈。 治眼方治目痒  
痛方 黃連半兩大棗一枚

凡二物以水五合煎取一合綿纏簪內剪中目日十過

竹著效

傳

集驗方治目中卒痒痛方 削干薑令圓滑內目眥中  
有項復內之辛竭者更易 葛氏方治風目常苦痒  
淚出方 以塩注眥中

カニ刀

治目赤爛眦方第廿五

病源論云目赤爛眦候風熱傷於目眦則赤爛其風熱

不去故眦常爛赤積年不差トモ葛氏方治數十歲眼

爛眦方 槲胡藁中心ナモア把署鎗中ナカ以五升水煮之ニヒ小拌コシ

覆上穿拌作孔目臨孔上癢痛當飯頃浚出一二升便

差 千金方治風眼爛眦方 竹葉四分 栢樹白皮ヒツキ六分

黃連四分 右並切以水二升煎取五六合稍用滴眼眦目三四

良 又方三指撮塩量錢上炭燒赤投少醋中ニヒ多淹錢以綿沾

汁注眦中 錄驗方治爛眦神驗方 黃連干薑雄黃

凡三物分等為散著日二昔治眼方眼鐵爛赤方

淳苦酒礼一升大錢二十七枚

凡二物燒錢令赤投苦酒中以著銅器中覆頭著屋瓦

陰地埋廿一日出爆ア干可丸卧藥如黍米著背ア中各一丸

不過十傳都差

又玄治目風爛赤眇眇恒濕神明膏方メクツ蜀椒フセハシカミ一分半

吳茱萸カハシカア半升ヲケラ木五合オキナカツラ芎藭ヤアセリヌウセリオホセリ五合オキナカツラ當歸オキナカツラ五合オキナカツラ附子オキナカツラ十五

枚カハシカア去皮カセモチヌヨヒクセ白芷オキナカツラ五合オキナカツラ桂オキナカツラ一兩オキナカツラ苦酒オキナカツラ二升半オキナカツラ猪肪オキナカツラ五升オキナカツラ十物オキナカツラ收咀

漬暑苦酒カ中二宿明且イシ內藥膏中熨火上剪之三上三下



留之冷乃上也三九為候色黃膏成以綿合布紋去滓密封セシカシ

若腹痛溫酒服如半棗一枚日三皮膚腫痛向火摩數

百過日三稍即心冬治風凍瘡治目爛赤汜神良驗也

醫門方瘡目赤背痛如刺不得用肝實契所致或障翳

方苦竹瀝カクタクシ五合黃連ワウレン二ニ搗碎ウツク薄綿裹內所瀝內竹

瀝中一宿許卧以瀝點眼中日數度浸下即差オカシ痛加火

棗五顆忌契麵酒蒜キキウコ

治目浸出方第廿六

病源論玄目為肝之外候若風邪傷肝氣不足故令目

眼論云眼赤痒淚出名為風眼也

淚出 治眼方 治眼中風寒骨赤痛淚出乳汁煎方

乳汁一升 黃連三分 干薑一分 麤核二分

凡四物以乳汁漬藥一宿明旦於微火上煎取三合

如黍米注眼四眚 又云治眼風淚出痒痛散方

決明子一分 黃連一分 細辛一分 干薑一分

凡四物治下後以乳取如麻子注眚中口可無三

又云治目中風淚出方

烏雄雞三歲者乃割冠取血且一傳暮卦又一傳良驗

葛氏方治目淚出不心方 黃連四兩以水二升煮取一升綿

半兩肉中曝復內盡汁恒以拭目 又云風目常苦痒淚

出方 以鹽注眚中 又方末黃連和乳汁傅眚中

又方席杖根イタリ煮汁ル以洗目 范汪方治目淚出不心方

燒馬矢コウカ細末ホモ絹篩フル以少々傳骨中 食經云目淚出不心

方 煮ムシ煮百合ムシ食上涕泣也

治目為物所中方茺ムラモウニギヤシ茺モ

療眼方治眼為物所觸ツキアテ中疼痛腫赤結熱甘草湯方

甘草一分 黃蘗キハク一分 苦參クラミ一分 當歸ヤブセリ一分 水二升二合モ煎

取七合待冷ヒユル洗眼日五六夜 千金方治目為物所撞青黑

方 炙羊宗尉ノル之勿令甚熱セ無羊宗用猪肝井ヲ井ヲキモ 葛氏方治

目為物所中傷有熱痛而闇方 斷生ハナクセ地膚ノチチクセ注之冬日煮ハニ

干取汁カレタル注也注 小品方同之 又方以水和雀矢以筆注之又方

乳汁和胡粉注日五已上范汪方同之 小品方治目為物所中方

羊膽ツギ雞膽ツギ鰓ツギ膽ツギ皆可用注之葛氏方同之 廣利方療眼目

掌基丸藥ツギ楨努肉出方ナゲキ 生杏人七枚去皮尖 細爵コトカニ吐於掌中及ソライ

煖以綿纏筋頭點努肉上不過三四度即老

治竹木刺目方第廿八

一名鰓 真

葛氏方治竹木刺目不出方 取鰓與頭二枚合繩貫以

人溺ナハリ煮令爛取汁灌目中即出 龍門方療眼刺不出

方 燒靛帶灰少コキフオヒハ服立出ハタチトコロニ 又方摩好書墨以筆

注目瞳子上出

治柏麦<sup>マク</sup>芒<sup>マク</sup>入目方<sup>マク</sup>第<sup>マク</sup>九

廣濟方療麦芒入目不出方 煮取大麦汁注目中昂出治眼方

治稻麦芒入目中方 取生<sup>イキタルハクモハシ</sup>蛸<sup>マク</sup>以新布覆目上以<sup>マク</sup>蛸<sup>マク</sup>從<sup>マク</sup>

布上摩之<sup>ナヒ</sup>芒出着布已<sup>ナク</sup>効<sup>ナク</sup> 又云麦芒入目方以<sup>マク</sup>蛸<sup>マク</sup>帶汁洗出<sup>破蠅蛸背著眯上半目出則</sup>

范汪方稻麦芒入目方 取麦汁注目中 蘇敬本草注

玄稻麦芒入目中不出者取蕞荷根汁注目中昂出

治芒草沙石入目方<sup>マク</sup>第<sup>マク</sup>十

葛氏方目卒芒草沙石<sup>マク</sup>華<sup>マク</sup>眯不出方 磨好書墨以新



筆染注瞳子上 又方塩豉各少ツギ着水中臨視之即出

廣濟方療眯目方 取少許翫帶燒作灰水服方

寸匕立出 治眼方治目中眯方ヌクツ 且起對戶門再拜已

言戶門狹小不足宿客便愈集驗方同之

又玄治芑物草沙輦落目中眯不出方 以鷄肝注之タケヒ

又方吞蜚矢一枚良 又冬豆中指節上隨目左右已上カヒコウクツ

千金方同之 千金方治目中眯方 書中白裏以乳和ツシノ

注之 醫門方療眯目不出視不見方 以蘓內鼻孔中カヒコ

隨左右垂頭淋前令流入眼中ツリ中浚出眯遂出無蘓イシ

猪脂亦往 范汪方治目昧不去生淫膚方 瞿麦干

薑 凡二物分等為散以井花水服 万圭日三

治鼻塞涕出方第廿一

病源論云夫津液涕唾得契則乾燥得冷則流逆不

能自收肺氣通於鼻其藏有冷々随氣垂於鼻故津液

不能息收之

槎要方療鼽鼻不聞香臭方

細辛代蒂等為末以吹鼻中須更大涕出恒能文自

通 今案經心方依蒂二分細辛一分作散 効驗方治鼻中不利

干薑散方 干薑二分 桂心一分 凡二物合下篩取契

鼽郭知玄云鼻内涕不能息收之

肉塞又云鼻内涕不能息收之

不聞外氣

散如豆塞鼻中須更通

豆許以綿裹塞鼻中藥行契物便去之

錄驗方治鼻塞不得喘息皂莢散方 カハラフチ 皂莢五分

昌蒲根五分 凡二物下篩以綿裹塞鼻孔中暮卧時着 ツツ

良 又玄治鼻孔偏塞中有膿血此乃是頭風所作魚 ナハ

由肺疾宜服此散方 天雄 オウ 八分 炮 干薑五分 暑預六分

通草六分 アケヒカツラ 山茱萸六分 イタチハレカマ 天門冬八分 ヒメトロクセ

凡六物治下篩為散酒服方寸匕日再

又玄治躄有息突及中風有濁膿汁出細辛散方 シラフネクセ

薑四分 細辛五分 皂莢二分 カハラフチ 朴四分 ナルハレカマ 附子二分 ツツ

凡五物下篩以綿裹如杏人大著孔中曰五音濁膿

盡

千金方治鼻窒氣息不通方水三升煮小薊一把并服之

又方綿裹依丁未塞鼻ハツセテ范汪方治鼻中多清涕方

細辛二分 樹二分 干薑一分 皂莢一分 桂心二分

凡五物治篩和以青羊脂裹以帛塞鼻中良

腎門方瘡久鼻塞清涕出不心方

附子六分 細辛蜀椒各八分 杏仁四分 細切以苦酒淹一宿成

練猪脂一升燬之剪之三上三下附子色黃去滓以綿裹內







纏著鼻中數日<sup>下</sup>息肉隨藥出 又方灸上星穴二百壯

又上星相去三寸各百壯

葛氏方治鼻中生息肉不通利方 樊石胡粉<sup>下</sup>末<sup>下</sup>青羊

脂和塗<sup>下</sup>宗上數佳 又方末陳<sup>フルキツ</sup>薇<sup>ホソ</sup>蒂<sup>ホソ</sup>注息肉

博濟安衆方瘡鼻塞息肉不通方

右以細辛末少許吹入鼻中自通 効驗方治鼻肉

宗方 胡麻成練樊石等<sup>下</sup>末<sup>下</sup>以針刺<sup>セシ</sup>息<sup>セシ</sup>宗<sup>下</sup>令破<sup>ホ</sup>以末<sup>ホ</sup>付<sup>ツク</sup>之<sup>下</sup>日

二以差<sup>セヨ</sup>爲限

治鼻中生瘡方第卅三

呼談反

病疸論云鼻是肺之候也肺氣通於鼻其藏有熱氣

衝於鼻故生瘡也千金方治鼻中生瘡方ツルカテシ燒祀電飯

末塗鼻中又方燒故馬鞍末傳之又方搗杏仁和

乳傳之又方馬牛耳垢傳之

又云治蚶魚食鼻方燒銅筋肉酢中浸之

治鼻痛方第廿四

千金方治鼻痛方恒以油塗鼻內外又方塗モ蘘亦佳

治鼻中燎方第廿五

耆婆方治人熱風鼻中燎腦中ツルカテシ所方杏仁去皮炙

藕二升內杏仁ツルカテシ於藕中煎之杏仁黃漚出之內曰中搗作

未還内蘗中攪令調少服之

治鼻衄<sup>ハナチ</sup>方第卅六

病洎論云肺用竅於鼻熱乘於肺則氣之熱也血氣

俱熱血隨氣發出於鼻為鼻衄 醫門方云上實下

虛其人必衄<sup>ハナチ</sup>發從春至夏為大陽衄從秋<sup>至</sup>冬為陽明

衄 小品方治鼻衄血出數斗眩<sup>胡蝶及</sup>暈<sup>ハチ</sup>者不知人方

干薑<sup>クタイ</sup>屑龍骨<sup>モ</sup>末吹之即止 又方取乱髮<sup>ハナキ</sup>五兩燒之治末

取如棗核<sup>セネ</sup>著筒頭吹著鼻孔中不止益末吹之并服方寸

匕日三甚者夜二 又云治鼻衄積年夜卧起而一

肩頭有瘀血數升衆治不差方 ルシトモ 春穀葉絞取汁 カキツ

日飲三升不過四五飲愈神良 千金方治鼻血出不等

冷水淨漱口瀨口含冰以導管中吹二孔中即止 シロフ

又方葱白一把切搗絞取汁瀝鼻中三兩涕入即止 キツネ

又方地黄汁五合酒一合煮取四合空腹服之禁酒炙

糞 フシ 下服粳米飲 ヤルシネ 又方濕布薄膏上又方灸上星

穴五十壯在當鼻入髮際一寸 又方灸涌泉二百壯在

足心陷者中 カアツ 葛氏方治鼻卒衄方 シタツ 苦酒漬綿塞鼻 フセリ

孔 又方釜底黑炭以吹內鼻中 又方水和粉如粥

狀以書和服之多少在意立愈又又方以綿裹白馬矢

塞鼻難文馬矢悉可用若大甚者絞馬矢汁飲二三升

可用干者絞取汁用之又玄大咽口耳皆血出不心方

補黃五合以水一升和一頓服又方鐸鐸以柱鼻下

又方放塩三指撮以酒服之不心更服也槎要方療鼻

衄血出數升令人眩冒劇者不知人方桂心三兩乾薑一

兩ハツリカマツヒ亂髮灰一兩右為散先食漿セキクチ粥服方寸匕日二

博洛安衆方療鼻衄不心方

右以糯米二合細研以冷水頓服廣洛方治鼻衄



出不<sub>血</sub>方 新汲水淋頭頂上六七斗并將浸脚立効

又方童子小便三四灌入鼻中立効 又方干薑削令頭

尖微煨塞鼻中立効 范汪方卒<sub>血</sub>出不<sub>血</sub>方

書額上作由字 又方濃<sub>血</sub>鞣<sub>血</sub>膠<sub>血</sub>額<sub>血</sub>膠<sub>血</sub>燐<sub>血</sub>血<sub>血</sub>煎已用良

又玄契病衄鼻多者出血一二斛方補黃五合水五升和

飲一頓盡即愈 醫門方治鼻衄血出不<sub>血</sub>方 生地黃

汁服一升須臾二三服兼以冷永淋頂上立愈 如意方治

鼻衄術 取衄血以書其人額<sub>血</sub>今<sub>血</sub>日<sub>血</sub>忌字即<sub>血</sub>當隨

今日甲<sub>血</sub>也 廣利方療鼻衄出不<sub>血</sub>方

經墨父  
墨也

刺薊  
イラクサ  
オホカサ  
ナリ

墨ハマツコ

濃研經墨鼻中<sup>點</sup>立効 龍門方療鼻出血不止方

搗刺薊汁<sup>アセアリ</sup>飲一升驗 又方灸頭頂上<sup>二</sup>七壯

治鼻中物入方第廿七

喉中氣如哽之

千金方治卒食物從鼻中落入頭中<sup>介</sup>痛不出方

牛脂<sup>羊脂</sup>若如大豆<sup>羊脂</sup>豉內鼻孔中以手取脂須臾脂消則物逐

脂俱出 今案無牛羊脂用猪脂

治緊<sup>クキル</sup>唇<sup>ウツリ</sup>生瘡方第廿八

病洩論云脾胃有熱氣<sup>アクキ</sup>發於唇則唇生瘡而重被風

耶寒濕之氣搏於瘡則<sup>ハルコシ</sup>發腫濕爛或冷或熱乍暑乍發

積月累年謂之緊屑之名潘屑也 集驗方治潘屑方

燒焚石令沸雜胡粉以傳之 千金方治緊屑方

臘怙一宿差 又方灸松脂怙上 又方灸席口男左女右七壯

又方先灸瘡後取地灰傳之大驗 又方燒乱髮蜂房

六畜毛作灰猪脂和傳之 又云治屑邊生瘡過年不差

方 又方取八月藍葉咬取汁洗之日三 葛氏方治審屑常

瘡爛方 燒葵根傳之 又方頭垢傳之 又方東壁

土傳之 新錄方治審屑方 蘘荷汁和酒洗日二三

又方馬莧搗汁洗之日三 又方擯棉帽灰付上 又方榆

根白皮帖上 龍門方瘡緊脣方 取地黃葉於坏凡器

中搗之使爛待于<sup>ヒルヲハリ</sup>刮取未塗驗 小品方治緊脣方

俗諺言良方善伎出於阿氏是余少時觸風乘馬行

臍<sup>臍</sup>數苦緊脣人教纏白布作大燈炷著空<sup>ヲシフラク</sup>斧中燒布

斧<sup>アセ</sup>刃有汗出以栢瀝取塗脣即差<sup>今葉千金方燒青布</sup>

治脣生核方第廿九

病源論云有風熱耶氣乘之而衝發於脣与血氣相搏  
則腫結外為風冷乘其結腫不消則成核

葛氏方治脣裏忽生九核稍大方 以刀鋒<sup>セキ</sup>決去其膿<sup>セクリ</sup>



血即愈千金方治屑生核方取指矢平量一升以水絞取汁トクメ燭

眼又玄屑玄忽生カク曰方燒鷄矢白作屑以布裹著

病上含日三

治屑黑腫クロアヒ堅硬方第卅

千金方治屑黑腫痛痒不可忍方取カク罽大錢カク於磨石上ルリ

以臘月猪脂磨取汁塗之又方以竹弓彈之出其惡血亦

差

醫門方療人口屑皮堅硬作ツグ痂皮裂時カセツラ血出恒痛キ屑皮

起落復生トモ歷トモ羊不差方



右以山中黃泥和水研令細熟以塗脣上當有毛出

出抽取燒之又塗毛盡差其毛干得

疥<sup>セキ</sup>癩<sup>カサ</sup>  
疥<sup>セキ</sup>癩<sup>カサ</sup>

治脣<sup>セキ</sup>灼<sup>セキ</sup>破方第卅一

葛氏方冬月脣干<sup>セキ</sup>灼<sup>セキ</sup>血出者方熬桃人鴉猪脂和塗之<sup>千金方同</sup>

又玄脣卒有傷缺破敗處者方刀鋒細割<sup>トキ</sup>用取新斂

麋<sup>カ</sup>鹿<sup>カ</sup>穴<sup>カ</sup>以<sup>ハ</sup>生<sup>ハ</sup>補<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>患<sup>ハ</sup>免<sup>ハ</sup>歟<sup>ハ</sup>又<sup>ハ</sup>然<sup>ハ</sup>禁<sup>ハ</sup>大<sup>ハ</sup>語<sup>ハ</sup>笑<sup>ハ</sup>百<sup>ハ</sup>日<sup>ハ</sup>

治脣面<sup>セキ</sup>腠<sup>セキ</sup>方第卅二

千金方治遠行脣面<sup>セキ</sup>腠<sup>セキ</sup>方<sup>至<sup>ハ</sup>先<sup>ハ</sup>尹<sup>ハ</sup>又<sup>ハ</sup>肥<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>ニク</sup>麋<sup>ハ</sup>煎<sup>ハ</sup>猪<sup>ハ</sup>脂<sup>ハ</sup>將<sup>ハ</sup>行<sup>ハ</sup>夜<sup>ハ</sup>常<sup>ハ</sup>塗<sup>ハ</sup>

面卧万里野宿不損 本草云塗<sup>ハ</sup>藥<sup>ハ</sup>良<sup>ハ</sup>

治口舌瘡方第卅三

病源論云平少陰心之經也心氣通於舌足大陰脾之

經也脾氣通於口府藏熱盛乘心脾氣衝於口与舌故令

口舌生瘡葛氏方治唯口中及舌生瘡爛方含好淳苦

酒即愈又方劉黃蘗恒含之又云若口表裏皆有瘡

者方又方劉黃蘗恒含之搗白蘘荷根酒漬含汁

搗白蘘荷根酒漬含汁錄驗方治口中十二病或腫或

有膿血或如飯粒青白黑起或如蠱乳或有根下斷

上飲食則痛方甘草桂心生薑細辛各一兩

凡四物淳苦酒三升煮取一升適寒溫含之

千金方治口契生瘡方

外麻六分

黃連二分

右二味本无篩綿裹含咽汁亦唾ハキ可去之又云口中瘡久

不差入膏中並生瘡三年以上不差方膿煮蘆薈根ニヤウヒ

汁冷稍ム咽之冬用根夏用莖論云凡患口齒有瘡禁

油麵酒腎シハニクハク酸アフラキキ贖干棗差後七日慎勿佳蓋薇根否

口瘡之神藥人皆不知今案博濟安衆方云根一握剉以水一升煎取五合入生蜜二合旋ハキ含之ハキ之

又云台上瘡方猪膏ハツアフラ一斤蜜二分甘草ハル如指三寸ハツ

右三味咬咀合煎相得棗大稍ハキ咽之日三

經心方治口瘡久不差方 棗膏三斤以水三斗煮

取一斗五升數洗愈 隨時應驗方口瘡方千薑炙炙

口中含吐契水盡即差 龍花妙方口瘡方 含礬石吐去

水今案博洛安衆方以白礬炙陰之又方以井水日三嚥ハカヘ弥好 崔禹錫食經

口瘡方食石莖良 博濟安衆方療口瘡舌硬語不得

方 白礬石一分 桂心一分

石為末シキ安舌上即語 范汪方治人口生瘡方 杏子二

枚

黃連一節 甘草一寸

今案本草甘草一尺者重二兩為心仍一寸者可五錢

凡三物治下



師綿絮裹之内着口中含之含汁稍咽之已用驗  
集驗方治口中生瘡方取黃蘗削去皮作如鴨舌含之  
咽汁弥好蜜漬含亦佳効驗方治口爛瘡無復皮方  
黃連三分附子一分榆皮三分凡三物治篩和蜜綿  
裹如舌子含之藥味盡吐出更含

治口舌出血方第卅四

病源論云心主血脉而候於舌若心藏有熱則舌上血  
出如涌泉巴葛氏方治口中忽血不心者方

灸額上入髮際一寸五十壯便愈又云舌上出血如替孔



者方以戎塩唐傳之 千金方治舌上出血有四五孔大如簪

者血出如涌泉此心病也治之方 戎塩唐五分 黃蘗

五分 葵子アツエウア五分 又參三分 桂肉二分 大黃二分 甘草二

分 炙 右七味丸如小豆飲服三丸日二不知上增至十九

經心方治舌上孔血出如泉此心病也燒鑢ヤシ熟燂孔中良

治九竅アサ四支コリ出血方第廿五

病源論云九竅四支コリ下ハ血者營衛大虛府藏傷損血脈

空竭目而喜怒失節驚悸過度暴氣逆溢致令湊理

開張血脉流散也言九竅出血喘欬而上ツ氣其脈數

有熱不得卧者死也 葛氏方云人九竅四支指間皆血

出此暴驚所致也以井花水濕其面當令卒至勿令病

人先知 又方粉升水和如粥飲之 千金方九竅出

血方務搗荊葉取汁酒服二合 又方灸上星穴五十壯

又方龍骨末吹鼻孔中血新為度 范汪方卒驚動七

孔皆血出方盜以井花水洒其面勿使知也

治欬血方第卅六

病源論云欬血者夫心主血肝者藏血愁憂思慮則傷心悲怒氣逆上而不下則傷肝心二藏傷故血流

散不<sub>レ</sub>氣逆則歔<sub>二</sub>血出也<sub>一</sub> 千金方治臨<sub>レ</sub>血方 栢葉<sub>二</sub>一斤

水六升煮取三升分三服 葛氏方治卒歔<sub>二</sub>血腹內絞急<sub>一</sub>

胃中隱然而痛<sub>二</sub>面色紫黑或從溺<sub>二</sub>出方<sub>一</sub> 灸膺<sub>二</sub>左右各

五分四壯<sub>二</sub>集驗方同之<sub>一</sub> 又方末桂一尺羊角一枚炙焦搗末分

等合服方寸匕日三四

治<sub>二</sub>吐血方<sub>一</sub>第卅七

病洎論云夫吐血者皆由大虛損及飲酒勞傷所致也

醫門方經曰凡諸吐血歔<sub>二</sub>血人若兼上氣喘咳不得卧

者多死難療 葛氏方治卒<sub>二</sub>吐血方<sub>一</sub>服補黃一分 又方

濃煮鷄糝飲汁亦治下血漏血良 千金方治吐血方

眼桂心末方寸匕日夜可堪服 又方亂髮灰水服方寸匕

曰三 又方熟艾三鷄子許水五升煮取二升頓服 又方葵

胃管穴三白壯 又方灸胃管穴五壯 小品方治吐血方

用東向藁荷根檣絞取汁一二升頓服立愈亦治蛇毒

痔血婦人腰腹痛大起後出清血也 錄驗方治血生

薑湯方 生薑五兩 人參二兩 甘草三兩 大棗十枚

凡四物咬咀以水三升煮取一升半分每服

范汪方治吐血下血不止方生地黃一升咬咀清酒五升微火



上合剪得二分半去滓強人頓服カリツ老少分每服スハ令李方

治吐血便血方干地黄黃芩ヒツラク各二兩凡二物治下莖

酒服方寸匕日三僧深方治吐血方龍骨多少治溫酒服

方寸匕日五六可至二三匕亦治小便血腎門方療吐血單

神方生地黄汁一分二合白膠カクツツ、ニカハ兩以銅器盛蒸之令消頓

服之三服必差神効龍門方療卒吐血不止方

取竈底黃土一斤以水一大升三合研澄飲之トキ廣利方

療吐血不止方荆蘆葉及根搗汁半升頓服之又方

生葛根ソルウ汁搗半大升頓服之僧深方云治吐血欲死



治唾血方第卅八

ハツ、美、マ  
ハツ、ニ、チ、フ、ハ、リ、チ、ハ、ル

病源論云唾血者傷損肺所為肺為五藏蓋易為傷損

若為熱氣所加則唾血如紅絡者此傷肺也黃波方

治人唾血及水逆不能食方 干地黄人參 補黃等分

為散以飲服一錢上日二腹痛者加夕藥八分 又方生大

豆五升以水二小斗煎取二升豆汁內一小升酒煎取一

升半分為二服三服又佳昂老 僧深方治唾血方

干地黄五兩桂心一分細辛一分 干薑一分 凡四物散酒服

方寸匕日三夜并 錄驗方治唾中有膿血牽脅骨痛

方于地黄五兩 桔梗三兩 紫菀三兩 竹<sup>タケウカハ</sup>如三兩 五味三兩

赤小豆一升 續斷三兩 <sup>オニウヤカラ</sup>桑根白皮五兩 甘草二兩 灸

凡九物切以水九升煮取二升七合分三服 葛氏方

治卒<sup>ニハカニ</sup>唾血方 取茅根<sup>チフネ</sup>搗服方寸匕亦可絞取其汁

稍<sup>シ</sup>飲之勿使頻多 <sup>槪要方同之</sup>又方服桂屑方寸匕日夜

令<sup>レ</sup>止許服亦治下血神方 千金方治唾血方 灸胃管

穴三百壯 又方灸胃管穴肺<sup>合</sup>愈 治口中爛痛方第卅九

治口中爛<sup>ツクシ</sup>痛方第卅九

千金方治口中爛痛不得食方 杏仁廿枚 甘草二寸 黃連

一分 右三味下篩合綿和累杏人許大含勿咽日三夜一

范汪方治口中爛傷唯咽不利方 樊石二兩 黃連一分

治齩如大豆二枚 置口中含創上キム小兒樊石如小豆日三

治口吻瘡方第五十

栗其皮名  
扶

葛氏方治口吻瘡方 燒栗クリ扶ツシ傳之 千金方治口吻瘡方

楸白皮ヒセキ及濕ナカラ怡上三四度 又方堀經年葵根クサナ欲腐者作灰

及熱アツ暑ウシ之又方取新炊甑下飯ツシキ及熱駐之注拔二七下 又玄治

口肥瘡方 熬ヤイ竈上飯未傳之イリ槎要方口吻白瘡方 燒

櫛ツ櫛カ一カ帽カ為灰傳上良

治口舌乾燄方第五

病酒論云府藏虛熱氣無心脾津液竭燄故令口舌干

燄也 葛氏方治口中契于燄方 烏梅ウメ棗サカキ膏ナツメ分等

以蜜和丸如棗含之 又方生薑汁一合甘草二分杏仁未二

分棗廿枚蜜五合 微火上煎丸如李ナ核含一枚日四

千金方治口中契于方 甘草四分人參四分半夏ホソク三分

烏梅肉四分 棗膏四分 石五味蜜和丸如彈丸含咽

汁日三又云治虛勞口于方カハシ 麥門冬二兩干棗廿枚 蜜

和差之三外米下服之 經心方治口乾方以水三外煮

石膏末シラハシタル五合取二升内蜜二升剪取二升煮去滓合棗核

大咽汁盡復含大良又方生葛根ワルツヨウ汁服二升之暑 蘇敬

本草注口干食軟熱柿也

治口臭方シセキ第五十一

胸古核多作臍胃内也

病洩論云口臭者由五藏六府不調氣上胃臍然府藏之氣膝腐目蘊積胃臍之間而生於熱衝於口故

含口臭也 養生方云空腹不用見臭尸氣入脾胃上白

黑起口常臭也 随煬帝後宮諸香藥方療口臭方

桂心 甘草 細辛 右三物分等搗篩服三指撮酒服



之廿日便差本元 錄驗方治口中臭令還香方 細辛三分

當歸三分ヤアセリ 桂心一兩 甘草二兩 凡四物切以水一升剪取四

合含之吐去之 千金方治口臭方 橘皮五分 桂心三分

木蘭四分 棗廿枚或本廿枚 石四味酒服方寸匕日三次服身香亦

可丸含之イヌム 日三 又方葵イリ 大豆令燻コカシ 及漿浹酢取汁含之

又方香薷イヌエヌ イヌアラク 一把以水一升剪取二分稍含之 經心方治口臭

水三分方水濃煮細辛カラ 辛シラ 合カ 以吐去 漱口吐廁中良又平旦如此 槎要方口臭方

常宜含イヌム 葶藶即愈 又方常含細辛即愈 葛氏方口

臭方 蜀椒一升 桂心一尺 朱三指 楸以酒服之 又方剪栢

子含之 崔禹錫食經云口臭方 取蓬蘽根汁慕

煎如膏常食之 又方永可食懷香 又方末檳榔子

含之 集驗方治口中臭散方 甘草五兩 芎オムナカラ四兩

白苾カセモノ三兩 凡三物治下齟漏服方寸匕日三

治張口不合方第五十三

葛氏方治卒失次領車蹉張口不得還方

令人兩手牽其頤已暫推之急出大指オヒヲ或咋傷也クヒヤフル

千金方治張口不合方 消鱸蜜又蜜滓也和水傳之德貞常方治張口

不合方 灸通谷穴在上管旁半寸 又方灸翳風穴在耳

後ノ陷中ヲセフ按之引耳中也

治舌腫ハシ 強ハクメル方第五十四

病洎論云心脾虛為風熱所乘隨脉至舌熱氣逆血

氣壅トフホリ溢故舌腫 千金方治舌腫滿口方半夏十二枚

洗酢升煮取含ハ含久吐良 又云治舌卒腫起如吹猪肥狀

滿口塞唯方以刀鋒決兩邊ソハシ第一大脉出血數升以燒鏡令

赤髮瘡數過以絕血 又方以指撞潰去汁亦可以刀破以

瘡膏塗之 又方釜底黑末和酢厚塗シ舌

上下脫去更塗須臾即消若先決出汁竟

与砒佳

瘡膏

千金

塗之。又方此患人皆不識或錯治益因殺人甚急但

看其舌下自有瘰癧虫形狀或似卧螫子細審者有頭尾

其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自銷 葛氏方治舌

卒腫起如吹猪肥狀滿口塞唯息欲不復通須臾不治則

斂人方直以拍撞決舌皮若不尔可以小鉞力決之當逆

舌兩邊又莫深傷之令裁足<sub>ネカニ</sub>以用其皮出血而已不可當

舌下中央<sub>ツビシ</sub>有大脉中此脉則血出不可心斂人也若決

皮而不愈者視舌下兩邊脉復判破此脉血出數升乃燒



鐵令小赤以灼瘡數過絕其血又方濃煎甘草湯含少時  
取釜底黑苦酒ハニ和厚塗舌上下脫去更塗須臾便消若  
先決出汁竟与弥佳 枕中方治人腫舌方 取水底石三  
七枚尉之

治重舌方第五十五

病源論云者心之候也脾之脉起於足大指入連於舌本  
心脾有熱氣隨脉衝於舌本血脉脹起變生如舌之狀  
在舌本之下謂之重舌 葛氏方治卒重舌方 未赤小豆  
以苦酒塗和舌上又方爲賊莫骨補黃ハナフハナ分等末傳舌上



又方灸兩足外踝各三壯 千金方治重舌方 取補黃

傳舌下日三四 又方電中黃去酒和傳上 僧深方治重

舌方 燒露蜂房淳酒和薄唯下立愈有驗 集驗方治

重舌<sup>舌</sup>以鉗針刺舌下腫者令血出愈勿刺大脉也

治懸雍卒長方第五十六

病洎<sup>コシタ</sup>論云五藏六府有伏熱上衝喉咽熱氣乘於懸雍

或長或腫 葛氏方治懸雍卒長數寸隨唯出入不得食

方 搗塩綿纏<sup>ミツル</sup>筋頭<sup>ミツル</sup>注塩就以楷<sup>カシ</sup>之日六七

又方用口以筋<sup>サシ</sup>作<sup>サシ</sup>舌乃燒小鐵於管中灼之若不類<sup>セ</sup>者

可三為之畢以塩塗燒燬

灼

千金方懸膺咽中生瘰肉古

腫方

シツネ

羊蹄草煮取汁口含又方以塩豉和塗之

シツネ

范汪方

懸膺卒長方

釜底墨以酒和塗舌上下即愈又方以

塩注其頭即自縮

ツクシム

シナレル

治風齒痛方第五十七

病洎論玄丰陽明之支入於齒是骨之所終髓之所養

若風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則痛齒

葛氏方治風齒疼痛類腫方

ツラフ

須煮獨活令濃及契含之

ツクリテ

ツツク

范汪方治風齒痛根空腫痛引耳類晝呼夜啼無聊賴

ヒルヒ

カラナカラ

ヤルツ

方 獨活四兩切以清酒三升器中炙<sup>ヤ</sup>炮之令稍<sup>ヤ</sup>沸令得一

升半契<sup>ヤ</sup>啗之輒吐神良 醫門方療齒楚痛<sup>ヤ</sup>嚼食不得

者方以生地黃桂二味相和合<sup>ヤ</sup>嚼之咽汁<sup>ヤ</sup>差 錄驗方治風齒

痛方 當歸<sup>ヤ</sup>三兩 獨活<sup>ヤ</sup>三兩 右二物細切絹囊盛清酒五

升漬三日稍含漬齒久<sup>ヤ</sup>吐去更含日四五過 耆婆方治

風齒疼痛不可忍驗方 獨活<sup>ヤ</sup>兩 細辛<sup>ヤ</sup>二升 枳<sup>ヤ</sup>一夕當歸

一分四味以好酒大升半微火煮令減半稍<sup>ヤ</sup>含之吐出更含

差為度

治齲齒痛方第五十八

病源論云手陽明之脉入於齒足太陽脉有入於頰遍於

齒者其經虛風氣客之結搏齒間與血氣相逐則齲腫

熱氣加之膿汁出而鼻侵食齲斷謂之齲齒也白風齲

玉五高及齲齒也

養生方云朝夕疎齒不齲又云食必當嚙口數過不介

葛氏方云案齲字書云病

使人病齲齲之那鑿論云治齲齲方蜀椒一兩樊石半兩

齲齲音起齲

桂心一兩一方分等凡三物以水三升煮取一升五合細

音而或應作齲

嚙口吐之今案范注方以細辛代蜀椒葛氏方治齲齒方桑

邊辰仲音其

足外踝上三寸隨齒痛左右七壯又方鷄舌香量虫齲

實有

上咋之ツラ又方取李枝削取裏白皮一杞以少水煮令十沸

也小出故



小冷含之不過三當吐虫長六七寸皆黑頭又方作竹針一枚東向以釘柱先咒曰冬多風寒夏多暖暑ソレカシ甲病齩七星北斗光鼓織女教我斷汝便孫ト云テ針ハカリメ時並咒曰孫之虫下不得動作三咒孫畢去勿及顧可千里遙治人但得姓名耳可至秘ハコキ千金方治齩齒方大酢一升煮芍クワカハ杞白皮一升取半升含虫出又方白楊葉ハコキ切一升以水三升煮取一升含又云齩痛有孔得食面腫方莽草七葉ハコキ楮桃根皮ハコキ長四寸者七枚凡二味以漿二升煮得一升適寒溫含滿口吐去即差范汪方治齩齒方有孔取細鐵



大小如孔中也トナ曲鐵頭火燒令契イシ以內孔中不過四五便痛心

錄驗方治齩齒方 取絲楊柳細枝除上皮取青皮卷如

梅李大含嚼之含汁漬齒根 醫門方治齩齒方以松脂アツヤニ

捻令頭尖ヒネナ注孔中フルトニシテ虫當出也 又方嚼薑蔞香咀汁立卷

小品方治甘虫食齒根方 伏龍肝カスウシリウツチシ置石上ツク看撮塩須臾化

為水以赴展取待ナレ凝厚取コルヲ內病上 又方皂莢セケキ去皮塗上虫

出 又玄治齩齒方 腐棘針ナツメウハリ二百枚是棗樹刺自朽落地者

凡一物咬咀以水二升煎得一升含嚙出即愈

治齒碎壞方第五十九

葛氏方治人病癰齒稍碎壞欲盡方 恒能以綿裹樊石銜

咋之咽其汁

治齒令堅方第廿

錄驗方云欲令齒堅方 可用樊石細辛分等合煮以嗽

口中 又方黃芩ノコ把根嗽良

治齒動欲脫方第廿一

病洎論云經脈虛風耶乘之血氣不能榮潤故令動搖

千金方治齒根動欲脫方 生地黃二兩 獨活ツクシ三兩

酒一升漬一宿含之 葛氏方治齒根動欲脫方 生地黃

根綿裹着齒上カハシクイ以汁漬齒根日四五為之能十日為

之長不復動

今案范汪方生地黃根肥大者一節咽其汁曰  
三其日即愈可數十年不復發

### 治齒黃黑方第六十二

病洎論云齒是骨之所終髓之所養也辛陽明足太陽之

脉皆入於齒風耶冷氣客於經脉髓虛血弱不榮養

於骨枯燥无潤故令齒黃黑 新錄方治齒黃黑方

取桑黃皮酢漬一宿洗七遍一古黃白皮此方二月及五

月五日用

### 治齒敗臭方第六十三

葛氏方治風齒、敗口氣、臭方

シヤア 齒草

シラウコクセ 細辛

カセモノ 白芷當山

獨活ツチクワ分等水濃煮含之、吐去汁

今葉廣方 獨活シヤ四兩、細辛四兩、白芷四兩

以水五升煮取二升去滓含之

錄驗方无芍、茵草

治齒斷腫方第六十四

病源論云：頭面有風，氣流入於陽明之脉，与斷間

血氣相搏，故成腫也。養生方云：水銀不得近牙齒，裁斷

腫，善落齒

コウムチ 經心方云：治齒根腫方

松葉一席，口塩二合，以

好酒三升煎取四五合，含之。食經云：齒根腫方，郁根煮含

之。槎要方：療牙齒動落，齒根宣露，或齒斷下血，出或

一席者  
一握也

斷腫契冷契物疼痛或齒根下黑更堅密口啗終身  
身不患風虫痛齒根下有黑物自出方

右每入五更即呬齒三百下至明欲梳洗時取尔戎

塩一顆咀爵令碎煎漱成漿每服取口中漿如棗

核大棗內之口餘漿平坐細嚥却嚥訖取柳

枝內外煎楷令淨其柳枝須臘日採其塩須補

州露滴者寢佳日別須作不得新絕若暑竹瀝

竹内水也

石塩不須口中漿

治齒斷間血出方第六十五

醫心方卷之六

ヨトハ



病源論云手陽明之支脉入於齒頭面風而陽明脉虛風  
挾熱乘虛入齒斷搏於血故血出 葛氏方治齒間津液血  
出不止方 煑石一兩以水三升煮取一升先拭血乃含之漱  
吐 千金方治齒斷間血出不止方 生竹茹四兩酢漬一宿含  
之 又方細辛二兩甘草一兩酢二升煮取一升含之 經心方  
齒斷間血出方取茗草濃煮汁勿与塩適寒温含漱竟  
日為之驗

治牙齒痛方第六十六

病源論云齒牙痛者是牙齒相引痛牙齒是骨之

茗茶也

所終髓之所養若髓氣不足陽明脉虛不能榮於牙  
齒為風冷所傷故疼痛也 樣要方瘡牙疼方

鷄古香三分 茵草シヤア三分 細辛三分 附子ヒ三分 梔榔ヒ二分

汗獨活三分 右搗五百杵勿從以絹袋盛如棗核大安牙

疼處從滿口吐之含二袋終身不發神驗 又方皂莢カハラフチ一

柱肥厚者剝去皮

右以驗酢半外剪令握調以桃披如筋一枚以綿裹

頭兼藥沾之當牙疼處燥ヤク之冷更沾熱藥日六七

度驗方

醫門方牙疼痛方

取楊白皮切以醋ル煎含之即差

又方取浪宕子オニヤハクセ燒以椀覆椀上令椀底作孔竹安筒當

牙フルフ董良オホアルクモ廣濟方治牙痛方

取槐白皮切一握酢三升モ煎取二升去滓內塩適寒溫含之

三五日即定也 集驗方治牙痛方

取柘竹燒一頭以桂鐵上得汁以著齒上即差

德貞常方牙疼方 灸浮白穴在耳後入髮際一寸

博濟安衆方療契毒風攻牙齦疼痛方

附子一个燒灰 白礬石灰一分

右二味為散楷齒立老極一妙又止牙有

孔疼痛方 附子一个為末以蠟為丸內孔中

龍門方瘡牙疼方 濕柳枝每旦楷齒不過三日疼

及口髮者之甚

治牙齒後涌血方第六十七

小品方治有飲酒醉吐牙後涌血射出不能禁者

方 取小釘燒令赤正注血孔上一注即斲釘當令赤

不赤能斲也

治齒齕方第六十八

要方卷之五

五十一

病源論云齒者骨之所終髓之所養髓弱骨虛風

氣客之則齒齲至初壞及齒傷酢也

養生要集云治食酸菓齒齲方 含白蜜爵之立愈

千金方治齒楚痛不可食生菓方 生地黃 桂心

右二味合爵令味相得之

治齲齒方第六十九

病源論云齲齒者是睡眠而相切也此由血氣虛風

耶客於牙車勸脉之間故目眠氣息喘而動引

其脉故上下齒相磨切有聲謂之齲齒

王胡載及齒相切也方言齲齲也



錄驗方治齩齒方 是睡眠而齒相切有聲也令人取

其卧蓆下云内其口中勿知<sub>シラレハコト</sub>之

治唯痺方第<sub>和ニ</sub>七十

病洎論云唯痺者唯裏腫塞<sub>ハシ</sub>痺痛水漿不得入

也風毒客於喉間氣結<sub>ナレ</sub>蘊積而生<sub>ナレ</sub>熱故唯腫塞而

痺痛亦令人<sub>ハ</sub>拮<sub>ナレ</sub>契而寒七八日不治則死

葛氏方唯痺水漿不得入七八日則<sub>ナレ</sub>斂人治之方

随病所<sub>ナレ</sub>近左右以刀鋒裁<sub>ナレ</sub>刺<sub>ナレ</sub>半<sub>ナレ</sub>父<sub>ナレ</sub>指<sub>ナレ</sub>爪<sub>ナレ</sub>甲<sub>ナレ</sub>後<sub>ナレ</sub>半<sub>ナレ</sub>分<sub>ナレ</sub>中

令血出即愈

<sub>俞今業龍門方云以繩絰半大</sub>  
<sub>指令微黑以針刺蠶文</sub>

又方随病左

右刺手小指爪甲下令出血立愈一當先將縛令向聚血乃刺之

又方螫舌入蜜丸如彈丸含咽汁 又方夜干三兩當

歸三兩水三升煮取一升稍含之吐去更含之

又方菰子マカサア石芥子カフシ搗苦酒和以薄

小品方治唯痺卒不得語方 濃煮桂汁服一升

覆取汗亦可未桂著舌下大良。又方取炊甑華燒作

屑三指少水服之即効 經心方治唯痺方

生薑二斤春取汁蜜五合 微火煎得服一合日五服

又方濃煮大豆汁含之无豆煮豉亦良

商

豉

又方剥タイテ蒜塞耳鼻日二易有驗 集驗方治唯痺方

吹咀常陸根イシノキ苦酒熬令契以薄唯上カヨ冷復易

龍門方唯痺方 取胡鷺ハクワスウ窠末水和服驗 録驗方

唯痺方取芥子カラシ一升舂碎水和以薄唯下干復易干

金方治唯痺方 未桂心ミナモト來核大綿裹著舌下須臾定

又方煮大豆汁含之 今菜小品方无豆

煮致カキハク良之

槎要方療唯痺方 馬蔕子カキハク卅九枚搗作末和水服之

立愈無子取根一大握搗絞取汁細コト鹽コト今菜廣利方

和蜜一コト醫門方治唯痺方 生艾葉ヨモギ就搗以薄腫處

是含之

隨手即消即神驗無比冬月以乾艾水擣薄之

新錄方治喉痺方

煮夜于含其汁吐出

僧深方治卒喉痺灸痛不得咽唾方

搗茱萸薄イタチハカア

之良 范汪方治喉痺方 燒稱鐵令赤著一坏涓カフハレカア

沸上出錘適寒溫盡飲之 又方杏人三分イタチハカア桂二分合

末著穀囊中含之コメ稍咽其汁今茶搗要方蜜丸如桃核火含之

傅渚安衆方瘡喉痺方生牛蒡研塗喉上

又方生研糯米入蜜服又炒為末怡喉上 崔禹

錫食經云喉痺方

食靈龜子腸殊効 又方食蓬力ホニ甚良

治馬痺方第七十一

病洎論云馬喉痺者謂契毒之氣結於喉間腫連頰而微壯熱煩滿而數吐氣呼之為馬喉痺喉

千金方曰喉痺深腫連頰吐氣數者名馬痺治之方

馬銜一具以水三升煮取一升分三服 又方馬鞭

草根一握勿中風截去兩頭搗取汁服 龍門方治馬痺

方 取馬藺草カキハタ根淨洗焼作灰一點燒素枝取瀝汁和

灰攪飲立差



治唯咽腫痛方第七十二

病源論云脾胃有熱氣上衝則唯咽腫痛

葛氏方治唯咽卒癰腫食飲不通方

用茱コアラ一把搗熬以薄腫上冷復搜之カヨ苦酒和之カヨ佳

又方吞薏苡子ノムツシタマ二枚 又方燒荊木取其汁稍咽含之和

又方燒稱錘令赤內二外苦酒中沸止取飲之

僧深方治唯咽卒腫痛咽唾不得消契下氣升麻含

丸方生夜于汁カラハアツキ六合 當歸ヤトセリ一兩升麻トリフツヤカサ一兩甘草三分

凡四物下篩以夜于汁丸之綿裹如彈丸含稍咽其

汁日三夜一

千金方治唯腫食飲不通方 含上好酢口舌瘡急佳

又方葵杏人令里末服 錄驗方五香湯治諸惡氣唯

腫結核方 沉香一兩薑蔭兩 麝香二分 青木香二兩

鷄舌香三兩

凡以水五升煮取一升半分三服

治尸咽方第七十三

病洎論云尸咽者謂腹內尸虫上食人喉咽生瘡其狀

或痛如甘蜜虫之催也 救急單驗方療尸咽方

鴉千薑和塩末注立差

龍門方療尸咽方

灸兩乳中間隨年壯驗

又方張口吸咽唾<sup>ハハトキウ</sup>入<sup>ハハトキウ</sup>中水見虫差

治咽中如肉腐方第七十四

醫門方瘡咽中如肉腐<sup>ノストモ</sup>蹠不入吐不出<sup>ハハトモ</sup>方

半夏<sup>ホソクア</sup>生薑 伏苓<sup>各四兩</sup> 厚朴<sup>各三兩</sup> 橘皮<sup>各二兩</sup>

水七升煮取二升半去滓<sup>カカ</sup>分温三服<sup>ヤクカニシ</sup>相去八<sup>コト</sup>九果

過雨<sup>ヒタ</sup>劑<sup>ヒタ</sup>如差

醫心方卷第五

醫心方卷五

二二二

六〇一





醫心方卷第五札記

二頁下 熱氣 延慶本熱上有歇字 三頁上 在右 仁和寺本在作左延慶本同

行 蛇膏 仁和寺本蛇上有馬字延慶本同 行 汁出 仁和寺本無出字 行 注

年聾 仁和寺本無二字 二頁上 効驗方云 仁和寺本無云字

桂二分 仁和寺本桂下有仁字 行 相擊 仁和寺本擊作掣 行 昌

氏方云 仁和寺本云作治 行 吼 仁和寺本作吼 三行 赤穀

仁和寺本穀作穀 行 注 今案 以下十四字仁和寺本無與舊校引字治本合 行 看

看藥 仁和寺本無看字作者藥 一行 博濟安衆方

至安耳中 以上四行仁和寺本無與舊校引字治本重忠本合 行 治令 仁和寺本

今作合延

九為心

仁和尚寺本

結鞭

仁和尚寺本

頁七

上九

草帶鈎

仁和尚寺本

下一

今鈎

仁和尚寺本

虫入

耳者方

仁和尚寺本

二林一撮

仁和尚寺本

改作

又方醫苦酒

仁和尚寺本

又方綿裹

又

方用車轂

仁和尚寺本

以慈沸

仁

寺本無以

又方車軀脂

仁和尚寺本

八水根

仁和尚寺本

識菜

仁和尚寺本

六新

煎

仁和尚寺本

下二

土熱

仁和尚寺本

仁和尚寺本

訛為蜈也

三行

白朮六分地膚子六分

仁和尚寺本

模移 行七 二斗 仁和尚寺本斗作年案原本模糊蓋舊作年

碑年作年蓋古人書 行八 粥清 仁和尚寺本下五 大唐

近年方 校引字治本重忠本合 注九行 葛氏方同之 仁

寺本無 下十一頁 二斤 仁和尚寺本 五 藥治 仁和尚寺本

行七 谷一 仁和尚寺本三 十二頁 數為之 仁和尚寺本

行三 旦 仁和尚寺本作日一 七 於精 仁和尚寺本無於字

而已 仁和尚寺本已字不塗 下八 解脰 仁和尚寺本

十三頁 赤鯉魚膽 仁和尚寺本 四 為雀目 仁和尚寺本

行六 雀起飛 仁和尚寺本 十四頁上 鯉膽若傳脰 仁和尚寺本

行六 雀起飛 仁和尚寺本

誤行三錄驗方仁和寺本傍書

行無可苦案可恐

倒垂於仁和寺本

下一甘刀仁和寺本甘

若釣仁和

寺本釣

行小大仁和寺本作小尖柴當作尖一

五十

作鉤

行字下有為字

十六頁著仁和寺本署字不重

下四

力截刀訛

行五其便仁和寺本

行綿注仁和

綿作

十七頁稀錫錫訛

行二欺眼仁和寺本

副反

洽反

仁和寺本

十八頁

瞻注仁和寺本

亦頁上

耳

蔗

仁和寺本作甘蔗漢西

行又玄仁和寺本以下七

治本

下六

三文仁和寺本

上一頁晝夜元前在

和



寺本無此五字

九虫螺  
仁和尚寺本出作生

下七和夜卧  
仁和尚寺本和字接上

亦三頁下三行

即心  
仁和尚寺本下有之字

亦五頁注也  
仁和尚寺本也作之

四行常中  
仁和尚寺本常作掌

七艷莫  
仁和尚寺本艷作艷

下六龍門

方  
仁和尚寺本下有治字

上六頁拜已  
仁和尚寺本下有跪字

六行又灸

仁和尚寺本下有方字

下四流逸  
仁和尚寺本逸作溢

五津液  
仁和尚寺本無液

字延慶

六行息収  
延慶本息作自

標外氣  
仁和尚寺本有焉頁反三字

九行注

仁和尚寺本延慶本同

上七頁治躡  
仁和尚寺本躡作躡

及

中風  
仁和尚寺本及作又

下八頁博洛安衆方  
仁和尚寺本無此方

九

頁上馬牛

延慶本馬作鳥

八行腦中炆  
仁和尚寺本炆作炆

聖心少長之已

三



弔比千墓 下九 夜二 延慶本此下有又方末龍骨為

文訃作訃 行 散著葦筒中吹鼻孔中即新若

受耳出亦可吹之 亦頁上 穀葉 仁和尚寺本 行 下二 雜

文 仁和尚寺本作新 三 可用 仁和尚寺本無此 下四行

傍 仁和尚寺本 上 三行 臘 仁和尚寺本 行 六 又方

取八月 延慶本無 上 三 頁 臘月 仁和尚寺本 行 下 六 以

劉 延慶本 上 八 行 成有 在誤 行 下 三 右二味 仁和尚寺本

字 無右 行 臘 延慶本 七 行 今案 仁和尚寺本 行 下 五

四 榆皮 仁和尚寺本 九 替孔 仁和尚寺本 下 六 行 洒其

面 仁和尚寺本 行 八 夫心 仁和尚寺本 下 七 行 人叅二

雨

仁和一寺本

行九生地黄

仁和一寺本生

上世八頁汁搗

作

仁和一寺本

行二

五藏蓋

仁和一寺本藏

行三

黃婆仁和一寺本

煮

作世九頁

行上

桑根白皮五兩

仁和一寺本

注六

行樣要

方同之

仁和一寺本

行下七

駐之

仁和一寺本駐

作

行八

口

吻白瘡

仁和一寺本

行上

合口

仁和一寺本

合

仁和一寺本

一頁上

行

來世枚

延慶本世作冊

合

仁和一寺本

行七

口

字

行下七

或咋傷

延慶本或

合

仁和一寺本

行四

二頁

脂

行六

燒鏡

宋本千金

冊三

行一

合

仁和一寺本

行三腫舌

延慶本

行四

七枚

之

延慶本此下有錄驗方

治

舌強不能語言下藥

醫心方卷之八

曰

焚石散方焚石二兩桂心二兩凡二物下  
飾置台下便能言三十五字加朱抹之  
行下七長數

寸延慶本此下  
有延慶本此下  
上六行入於齒  
仁和尚寺本入  
九行傍記

扶也  
仁和尚寺本  
扶作快  
行下三  
合爵  
仁和尚寺本  
合作舍  
行八  
差為度  
慶延

本此下有葛氏方治風齒痛方燒牛膝根末齒間著愈  
又方昌蒲根爵汁含漬齒即愈陶景本草風齒方李皮

水煎含之牛旁爵汁含漬齒灸穴翳風在耳後陷  
者中曲記在肘外曲骨中六十七字加朱抹之  
五

上二  
結搏  
仁和尚寺本  
結作終  
相兼  
仁和尚寺本  
兼作兼  
三行  
葛氏方

至邊底  
以上四字延慶本  
為風竊注文辰作虫  
行四  
疎齒  
仁和尚寺本  
疎作疎下同

七行  
鉢  
仁和尚寺本  
鉢字不重  
行下二  
以釘  
仁和尚寺本  
釘作針  
三光鼓

仁和尚寺本  
鼓作鼓  
卅六頁  
下一行  
病癰齒  
業癰即歷字從  
可者冒上病字  
行二  
咽其

汗仁和尚寺本 上世六行頁新錄方延慶本 行七一云

延慶本以下十六字 獨活分等仁和寺本 恐誤脫

白忠仁和寺本 行七經心方云仁和寺本 上世八行頁

印戎疑 下二血出仁和寺本 行六塞溫仁和寺本

塞作 行九齒牙仁和寺本 下世九行頁方牙仁和寺本

行六一頭延慶本 行八博濟安衆方以下四行 仁

一行上楷齒延慶本 下二玉初樣及業樣旅之俗求

又五合爵仁和寺本 行七睡眠仁和寺本 相切仁和

寺本相下 行八目眠仁和寺本 上五十一行睡眠仁和

有磨字 行八目眠仁和寺本 上五十一行睡眠仁和



作眠

行二 卧蓆

蓆仁和尚寺本

行六 而寒

惡字延慶本而下有

惡

行八

父指

父仁和尚寺本

注九

繩經

經仁和尚寺本

行四

稍

仁和尚寺本

行八

屑三指

延慶本指

上三行

唯

痺

仁和尚寺本

窠末

仁和尚寺本

行四 唯痺

仁和尚

治字 喉上有

行六

煮大豆

仁和尚寺本

注九

和蜜一

三字

原紙缺今

據仁和尚

行下五

桂二分

仁和尚寺本

行六

囊

仁和尚寺本

今案

仁和尚寺本

行七

傳洛安衆方

以下

字仁和尚

五十三頁

馬痺

仁和尚寺本

行六

馬街

街作

行八

一匙

仁和尚寺本

下五行

和

仁和尚寺本



九含稍

業原補業作合和二字  
今據仁和寺本改正

五十四頁  
上九行

戒痛

和仁

寺本或上有  
戒痛二字

胃心方底之凡已

八



醫心方卷第六

從五位下行鐵博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

胃痛方第一

治脇痛方第二

治心痛方第三

治腹痛方第四

治心腹痛方第五

治心腹脹滿方第六

治卒腰痛方第七

治緊腰痛方第八

治腎著腰痛方第九

治肝病方第十

治心病方第十一

治脾病方第十二

治肺病方第十三

治腎病方第十四

大腸病方第十五

治小腸病方第十六

膽病方第十七

治胃病方第十八

治膀胱病方第十九

治三焦病方第二十

治氣病方第二十一

治脉病方第二十二

治筋病方第二十三

治骨病方第二十四

治髓病方第二十五

治皮病方第二十六

治完病方第二十七

治胃痛方第二十八

病源論云胃脇痛者由膽ナド与肝及腎之文脉ムラト虛為

都致文

時忌文

寒氣所乘故也此三經之支脉並循行胃腸耶氣乘於胃腸故傷其經脉耶氣之与正氣交擊故令胃腸相引而急痛也

葛氏方治胃痺之病令人心口緊痞急痛肌中苦

符部及腹内結病也

痺絞急如刺不得俯仰其胃前皆痛手不得犯胃

皮エカ

滿短氣咳唾引痛煩悶白汗出或徹引背脊不知治

セナカ示

之數日數人方

橘皮一升枳實四枚生薑半斤水四升煮取二升分

為再服

令素小品方枳實三兩水五升



又云若已老復更發者 取ニラノネ葎根五斤ヤシキ搗絞取汁飲之

立愈

千金方云胃痺之病令人心リ中緊急痛肌中苦痺

急如刺不得ナ視仰其胃中ル愒盈満良如滿咽塞習ノ痺喉中ノ

乾燥時欲嘔吐胃及背引痛手不得カ化胃滿短氣ノ

咬カ啞引痛煩悶白汗出或徹背引痛忽不知治致人方ノ

枳實カラタチ四枚 厚朴三兩 薤白ニラノネ一斤 桔梗子カラフル一枚

桂心一兩 五味水七升煮取二升半分再服

錄驗方治胸痛達背不得卧方

大栝樓實二枚

切

薤白三升

切

半夏半升

洗

生薑六兩

切

凡四物切以清白漿二升一斗煮取四升一服一升

極要方療胃滿氣築心腹中令方

半夏一升

洗

桂心八兩

生薑一升

石以水七升煮取二升七合日三服

醫門方療冷氣胃中妨滿或痛方

半夏四兩

生薑五兩

厚朴四兩

枳實半升煮取二升

去滓分溫二服相去八九里頃服二三劑

治脇痛方第二

病源論云耶氣客於足少陽之絡令人脇痛

葛氏方治脇卒痛如得打方以繩橫度兩乳中間

繩從乳橫度以起痛脇下灸一繩下屈處卅炷

小品方治脇下偏痛茲契其脉弦此寒也當以溫藥

下其寒大黃附子湯方大黃三兩附子三枚細辛兩

凡三物以水三升煮取二升分二服

千金方治冷氣脇下注來臍痛引脇背常歸湯方

當歸二兩 吳茱萸二兩 伏苓一兩 桂心二兩

干薑三兩 枳實一兩 人參二兩 芍藥二兩

大黃二兩 甘草二兩

十味以水八升煮取二升半一服八合日三服凡注

名佳

今案桂要方有干地黄無干薑夕藥

又治兩脇下痛方

槲湯漬兩足冷則易

治心痛方第三

病源論言心痛者風冷耶氣乘於心也其病發有

之忍之瘕皮外小起也

死者有不死成痼者心為諸藏主而藏神其心經不

可傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心

有支別之絡脉其為風冷所乘不傷於心經者亦令

心痛則アルイハヒナアリ作イエ間ニ下ニ甚故成痼不死

葛氏方治卒心痛方

當力以自坐若男子病者令婦人以一坏水与飲

之若婦人病者令男子以一坏水与飲之得新液并

水尤佳 又方吳茱萸五合 桂一兩 酒二升

煮取一升分二服 又方吳茱萸二升 生薑四兩

豉一升酒六升煮取二升半分三服 又方切生薑

若干薑切半升以水二升煮得一升去滓頓服之

又方取竈中契アイヒ灰フルヒ去疾芥アウタ燔ノル慰心上冷復易



錄鈴方治平心痛方

並大豆若糞之以囊盛更燻以

熨心上冷復易之已熨之豆不可令畜生犬等食之即

死 又云治人心痛

於報文 於緣及莫國又  
懊懷音ハ悶音ハ第音ハ引音ハ雨乳立或如

刺困極桂湯方 桂心半兩 茱萸二升 名藥三兩

當歸二兩 生薑半斤 凡五物切以水一斗二升煮取四

升服一升日三夜一有驗元生薑用干薑五升代

備急方治心痛方極鹹シハナシ作塩湯飲三升吐則即老

耆婆方治心平心痛欲死方

吳茱萸三兩 夕藥三兩 桂心三兩

右以淳酒大一升生煮之令有半升在瓶服

僧深方治卒心痛方

當歸<sup>ムナセリ</sup>二兩<sup>エヒル</sup>夕藥<sup>ヒル</sup>一兩桂心一兩<sup>ホト</sup>

人參一兩<sup>或云九</sup>玄子廿一枚

五物<sup>ホト</sup>改咀以水七升煮取二升半分

眼五眼

又治卅年心痛附子丸方

人參二兩桂心二兩

干薑二兩蜀附子二兩巴豆二兩

凡五物下篩蜜丸如大豆<sup>七キニ</sup>先食<sup>ヨリ</sup>服三丸日一神良<sup>ナリ</sup>

新録方治心痛方

飲井花水二升又方以漿湯漬半

足以老為度

又方燒秤錕令赤投二升酒中分二服

又方水服米粉一匙

集驗方治卒心痛方

桂心八兩以水四升煮取一升半分再服 鑒真方治心痛  
方大驗酢半升切葱白一莖和煎頓服立愈

范汪方治卒心痛一物桂心散方 桂心一兩為散溫酒  
服方寸七日三不飲酒以米飲服之

又云備急丸方巴豆一分 大黃二分 干薑二分 搗篩異  
治巴豆合丸如大豆有急取二三丸以水服之

如意方治卒心痛術 書地作五字撮中央以水一升

攪飲之 小品方解急蜀椒湯主寒病心痛如刺繞

吞紋痛腹中盡痛白汗自出欲絕方 蜀椒三升枚

一方二百枚 附子ヲク一枚 梗米ワルシネ半升 干薑ヲク半升 大棗ヲク十枚

半夏キソクミ十二枚 甘草ヲク一升 凡七物以水七升煮取三升

湯成契服一升不覺復服一升數用治心痛寂良

千金方云九痛九主九種心痛一虫心痛二淫心痛三風心

痛四悸心痛布對及乱也五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛

九生來心痛其季及心動也方悉主之并治冷腫上氣落馬頭車方

附子二升 巴豆ヤセク人參ヤセク生狼毒ヤセク二兩失令極香秤人參ヤセク一兩

干薑一兩 食茱萸オホタマ一升 六味蜜和空腹服如梧子三

九卒中惡腹痛口不言二日一服連年積冷流注心胃



者三服之好<sup>トキ</sup>持息<sup>ヤム</sup>亦驗 又方能白皮汁煮空腹服

之 又云凡暴心痛面無色欲死方以布裹塩如

彈丸燒令赤置酒中消服之 又云灸心痛方

心懊<sup>ヤウ</sup>懷<sup>クワ</sup>微痛煩<sup>セハ</sup>逆<sup>セハ</sup>心痛如刀刺氣結<sup>セハ</sup>心痛如刀刺氣結<sup>セハ</sup>心痛如刀刺氣結<sup>セハ</sup>

心痛<sup>ヤウ</sup>旬痺<sup>ヤウ</sup>心痛<sup>ヤウ</sup>冷氣上<sup>ヤウ</sup>心痛<sup>ヤウ</sup>暴絞急絕欲

心痛惡氣上脇急痛<sup>ヤウ</sup>心痛<sup>ヤウ</sup>暴絞急絕欲

死<sup>ヤウ</sup>心痛<sup>ヤウ</sup>暴絞急絕欲

心痛<sup>ヤウ</sup>暴絞急絕欲

救急單驗方冷心痛方 吳茱萸一升桂心三兩當歸



三兩搗末蜜丸如梧子酒服亦丸日再漸加卅丸以知

一七

為度

又云蛔心痛方

取蚰

香曲是演反

蟥糞燒令赤末之酒

服驗

又云一切心痛方

七計及衆也

生油半合溫服立愈

又方服當歸末方寸匕和酒服差

孟詵食注治心痛

方

酢研青木香服之

治腹痛方第四

病源論云

腹痛者由府藏虛冷熱之氣客於腸胃

莫故反

募原之間結聚不散正氣與邪氣交爭相擊故痛

其有冷氣搏於陰注者則腹痛而腸鳴謂之寒中

アツル

其有冷氣搏於陰注者則腹痛而腸鳴謂之寒中

葛氏方治<sup>二カ</sup>卒腹痛方書各上作風字。又方搗桂下

篩服三方寸<sup>二</sup>苦<sup>ク</sup>參<sup>ス</sup>忌佳干薑亦佳。又方食塩一大

握多飲水送之當<sup>ハク</sup>吐即<sup>ハク</sup>老。又方堀土作小坎以水滿坎中

就<sup>ムク</sup>攪<sup>カ</sup>取汁飲之。又方令人<sup>シ</sup>騎<sup>マ</sup>其腹<sup>ノ</sup>滿<sup>セ</sup>齋<sup>ハ</sup>中<sup>ノ</sup>之

又方米粉一升水二升和飲之。如意方治<sup>ニ</sup>卒腹痛術

書帛作兩蜈蚣<sup>ムカデ</sup>相交吞之。今案葛氏方用之

醫門方治腹痛方桂心三兩切以水一升八合煮得八

合去滓頓<sup>脹</sup>元桂心煮干薑<sup>二</sup>佳范汪方云當歸湯主寒

腹痛方當<sup>ウ</sup>歸<sup>セ</sup>三兩桂心三兩甘草二兩干薑三兩

凡四物水八升煮得三升服一升日三又云當歸

九一治寒腹痛如刀刺方當歸三分七斤芍藥三分七斤黃

芩四分桂心一分凡四物治而和蜜丸如梧子服九

先食日三セイヤス

千金方溫脾胃湯治腹痛伴移友膈下繞結遠能膈不止方ホシノ

當歸五兩干薑五兩附子三兩甘草二兩大黃五兩ヤナ

人參三兩芒消三兩七味以水七升煮取三升分三服日三

又云系腹痛方灸巨闕穴在鳩尾下一寸

又方灸承穴在膺上一寸又方灸中極穴在膺下四寸

治心腹痛方第五

病源論云心腹痛者由府藏虛弱風寒客於其間

故也耶氣發作オツリ与正氣相擊上衝於心則心痛下攻

於腹則痛腹上下相攻故心腹絞痛氣不得息ヤ葛氏

方云凡心腹痛若非中惡霍亂則昏是宿結冷契所

為也治心腹俱脹フク短氣欲死或已絕方桂三タニイル方

切以水一升八合又云若心腹痛急似中惡者方持生忌補根汁服之得八合去滓頓服无桂者干薑今下因野姜佳

千金方治心腹卒絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可堪忍

方高粱薑五カハネノ七方原朴二兩多當歸三兩桂心二兩以ナセ

胃心方

乙



四味切以水八升八合煮取一升八合分爲三服一服容

日二若モシ一服痛止ヤ便停トム不須更服若人強者バヤク一服一升

爲再服日二 小品方治寒疝心腹痛方夫寒疝腹中

痛逆冷手足不仁ヒミヤキ若一身疼痛灸刺諸藥所不治者

桂文湯加烏頭湯主之 桂肉カハク三升生薑三升甘草

二兩夕藥三升大棗十二枚 烏頭ウヅ五枚附子一名九月採破之キレ蜜一升本元煎

凡五物以水七升煮取二升半內蜜ハチ分服五合日三

槌要方療心腹久寒卒發絞如鬼刺欲死湯方吳茱

萸二升 香豉三合生薑四升石以好酒本元五升煮取二



升分服之。下喉杯未去口病便心。令咽水。又云。瘰癧在

心腹病不可忍方。右取桃東七廿ル刺ツ去蒼皮取白六カハ

皮一握モリ以水二升煮取半升服之。醫門方療平

心腹痛方。厚朴三兩桂心二兩以水三升煮取一

升服之。若卒痛如刺者キナラセ但煮桂汁飲之佳。僧深方治

惡氣心腹欲死方痛仙ル。夕藥一兩甘草二兩桂心一兩

當歸二兩。凡四物永五升煮取二升分再服

耆婆方治人心腹絞痛不心方ミホリ。生薑干兩桂心三兩

甘草三兩人參二兩。四味切以水一斗煮取二升分服

治心腹脹滿方第六

病源論云心腹脹者脾虛而耶氣客之乘於心脾故也

葛氏方治卒苦心腹煩滿又胃脘痛欲死方

以契湯令ハタカシ的ヒタセ尔ヒタセ漬手足冷復易秘方又方冬乳下一寸

七呔又方搗香薷汁服一二升

又方判薤ハタカシ根イヌアスギ煮取汁服三升桂要方備急丸療

忽然心腹脹滿急痛氣絕大小便不通方大黃五兩

干薑二兩巴豆三兩去心焚芒消三兩

右蜜丸平曉飲服四九不利七八セ更加一二九取得九五

慶利<sup>モシ</sup>如不<sup>ヒオラ</sup>心取<sup>ホナ</sup>醋飲<sup>ヤム</sup>心之新録方治心腹煩滿方

桃人去皮搗如泥<sup>アヤシ</sup>契酒<sup>シ</sup>服如棗二枚日三又煩滿吐<sup>ツクセ</sup>

送方生薑一升合皮切搗取汁溫服之<sup>アタメ</sup>又方生薑<sup>クダ</sup>

取汁服一合二合<sup>ホナ</sup>醫門方云凡患<sup>ハナク</sup>脹滿煩利

藥下之心腹中痛<sup>ホナ</sup>妨不去氣又築心者<sup>ツク</sup>緣胃中虛氣

上衝心故也<sup>ツク</sup>又參三升甘草三升<sup>ツク</sup>橘皮二升棗<sup>ツク</sup>

顆水七升煮取二升半<sup>ツク</sup>滓久溫三服若心忪加<sup>ツク</sup>伏苓三兩

又云腹脹滿不能服藥導之方<sup>ツク</sup>取獨頭蒜<sup>ツク</sup>燒令<sup>ツク</sup>熟

去皮及契<sup>ツク</sup>以薄綿裹<sup>ツク</sup>內下部佳冷易之<sup>ツク</sup>又方暖生薑

胃心分

ト一

削綿裹ケリ內下部中冷湯之佳 耆婆方治人腹脹痛方

厚朴三兩 高梁薑ケレノハシカニ三五 切以水三升煮取一升半

飲之乃止ヤム 僧深方云厚朴湯治腹滿數十日脈浮

穀食飲如故方 厚朴半斤 枳實カヲクチノク五枚 大黃四兩

凡三物以水一斗二升煮取五升內大黃一微火煎令

得三升先食服一升日三

本草云可梨勒水ケリ摩ケチ或散水服之 蘇敬本草注

云櫛櫛子ケリ鴉末服之 孟詵食經云薤ニラキ可作宿ツリヤト

空腹食之



治卒腰痛方第七

病源論云腎主腰腎經虛損風令乘之故腰痛也

又耶客於足大陰之絡令人腰痛引小腹ホンネツ不可以作息下ニキヤルム

凡腰痛有五一日少陰二腎也十月万物陽氣皆傷ヤフル

是以腰痛二日風痺風寒著腰是以腰痛三日腎虛トキニ

倭用傷腎是以腰痛四日槩腰墮墜傷腰是以腰トキハ

痛五日寢卧濕地是以腰痛 養生方云飲食勿

即卧久作氣病令腰痛疼 又云笈多則腎轉トキ

腰痛 千金方杜仲酒治五種腰痛方來寄生杜トキハナシ



仲 庶茸カノホカシ桂心 四味分等末服方寸匕日三

又方治腰脊疼不隨方 庶茸セナカヒシ去上皮取白者一

葵黃末酒服方寸匕日三特禁生食餘不禁新者

良陳者不服甬中黃ナル麋亦不中服太次大之神良ナリ今牽葛伏方

庶茸  
丸佳

錄驗方治腰脚疼不可忍不能立胡麻散方取胡

麻葵令香於臼內搗碎タタキ即以紗羅篩フル之數之セ篩之

若セ不數篩セ即脂出不可篩タカラ合皮日一服每服小升服

盡藥斗三升永無腰脚之疼此藥辟穀不飢多

服即減食任以酒及飲蜜湯羹汁亦並得服木ホキ无禁

小品方云灸腰痛法

令病人正踞立以竹杖ツイ注地ツイ

度至脊以度注地背正灸脊骨上隨年炷灸竟藏セホネウ

竹勿令人得之灸丈夫痔下血及脫肛不入及息

下長泄利婦人女子月崩去血アルトキハ正下發及滯下

淋瀝長去赤白雜汁皆灸此ハセメ又使兩傍各一寸復

灸之為橫三穴間一寸也又灸腰目小耶在尻上左

右陷處是也クホナル葛氏方治卒腰痛不得俛作方アフラク

正倚立セ義反竹以度其人足下至脊斷竹又以度之背分リ

後當脊中灸竹上頭<sup>カニノヘ</sup>裏退年<sup>カクシ</sup>壯畢<sup>カクシ</sup>歲竹勿令人

得之 又方去窮骨上一寸灸七壯其左右各一

寸灸七壯 范汪方治腰卒痛物急不得喘息若

醉飽得之欲死大豆紫湯方 大豆一斗<sup>イリ</sup>熬令<sup>イリ</sup>

好酒二斗二物合煮令<sup>アハクホカセ</sup>契沸隨人多少服令<sup>イリ</sup>醉

醫門方療卒腰痛不得轉側方 鹿角一枚<sup>カクハ</sup>長五六

寸截之燒鹿角令<sup>キ</sup>赤內酒中浸之須臾又添還內酒

中如此數度破碎便即浸之一宿平晨空腹飲令<sup>カカシテ</sup>醉<sup>イリ</sup>

治<sup>イリ</sup>腰<sup>イリ</sup>方第八

病源論云緊腰者謂卒然損傷於腰而致病也此由  
損セリ血搏アツ於腰脊所為久不已令人氣息セリ少而元顏色  
損セリ腎之故也 葛氏方云概腰者是及腰忽動轉

而梳ヒツ之治概腰痛欲死方 生葛根クハノネ削ケ之ハナリ爵咽カヌノム其汁

多ク益佳 又方生地黃クハノネ搗ケ紋取三升ハナリ剪得ハナリ二升白蜜

一升日三服不イエ差更作 又云治及腰有血痛方 鳩

桂下フル篩フル三升許以苦酒和以セリ墜痛上ヒ干復ル墜 又方

冬足腫白突際三貼 范汪方治概腰方 寄生クハノネノホヤ來

上者カンネカハ鹿茸桂心牡丹分等為散服方寸匕日三又方灸



足跟<sup>キヒル</sup>白肉隆三九 又方灸腰目十九

治腎暑胛痛方第九

病源論云腎經<sup>トキ</sup>虛則受風冷內有積水風相搏漬

於腎氣內著不能宣通故胛痛其病之狀身

體冷腰腹重如帶五千錢狀如坐於水形狀如水不渴

小便自利食如故久變為水病

千金方云腎暑之為病其人身躰重胛中冷所以如

水洗狀又不渴小便自利食飲如故是其證也

作勞汗出衣裏冷濕久之故得也腰以下冷痛腹重如



帶五千錢腎著湯主之 甘草一兩 干薑二兩 伏苓

四兩 朮<sup>ノケ</sup>四兩 四味水五升 煮取三升 分三服 腎中即

溫<sup>ノケ</sup> 今案集驗方无本 僧深方伏苓湯治腎著之為病從

腰以下冷痛而重如五千錢腹腫方

飴<sup>アハ</sup>膠八兩 白朮四兩 伏苓四兩 干薑二兩 甘草二兩

凡五物以水一斗 煮取三升 去滓 內飴令<sup>トカ</sup>得<sup>トカ</sup>服

治肝病方第十

病源論云肝氣盛為血有餘則病目赤兩脇下痛

引小腹善怒氣逆則頭眩耳聾不聽<sup>ノケ</sup>頰腫是為

肝之實也則寫之肝氣不足則病目不明兩脇拘急

筋牽不得大息凡甲枕面青善悲恐如人將捕之

為肝氣之虛也則宜補之 千金方治肝虛寒脇下

痛脹滿氣急眼昏濁視不明檳榔湯方

母薑七兩附子七兩檳榔廿口伏苓三兩桔梗四兩

橘皮三兩白朮四兩吳茱萸五合桂心三兩九味

以水九升煮取三升去滓分三服 又主治肝實契目

痛胃滿急塞寫肝前胡湯方 前胡三兩秦皮

三兩細辛三兩 艾子人三兩 黃芩三兩蜀椒三兩

蓮核三兩

碎

決明子三兩

苦竹葉一升

切

車前子一升

芒消三兩

十一味以水九升

煮

取三升去滓下芒消三

服

錄驗方

補肝湯治肝氣不足脇下滿筋急不得

大息

山ル

厥逆

心脚中

痛

兩目

不明

面青

方半

黃一兩

烏頭

オウ

四兩

栝子

四兩

大棗

一枚

龍膽

四兩

凡五物

切以

水五升煮取一升去滓一服令盡

僧深方寫肝湯治肝氣實目赤

モヒハ

黃脇下急

小便

難方

人參三兩

生薑五兩

黃芩二兩

半

復一升

洗

甘草二兩

大棗十四枚

凡六物

切水五升

煮

半

復令三

ホソクニ

升

服

令三

升

四沸內藥後イル薑イシ葵取カキ并去滓分二服カヒタリ羸人三服

治心病方第十一

病源論云心氣盛為祚有餘則病シハ胃內痛脇支滿

膺背ムネ膊カタ解間痛兩臂內痛善ヲム嘔吐不休是為心氣之

實也則宜寫之心氣不足則胃腹相引痛驚悸布對及悸恍惚

少シ顏色玄本コハク強善憂悲是為心氣之虛也則宜補之其本及

千金方治心虛寒心中滿脹悲憂或夢山ホシ坂カ平澤半

夏補心湯方 半夏ホシノク六兩洗宿薑イカハシ三兩 伏苓ホシ三兩

白朮四兩 防風ハナカ二兩 桂心三兩 遠志唐二兩 檮枝三兩



九味切以水一斗煮取三升分三服

錄銓方治心上虛契胃中時痛口生瘡四大羸少

氣方 茈胡ヒキヨモキ四兩 升麻トナリシノ三兩 黃芩三兩 生地黄

八兩 芍藥モルノ四兩 地骨白皮コノカハ五兩 枳實タチ三兩 生

薑三兩 竹葉二兩

凡九物切以水八升煮取二升七分合分三服

耆婆方治人心中繫風見鬼來親合陰陽且便力乏

黃瘦不能食日轉羸方

龍膽三分 苦參クサキ三分 右二味為散以白米飲一服一錢



日二服忌猪完酒麵

治脾病方第十三

病源論云脾氣盛為形有餘則病腹脹溲不利身

重口苦飢足不收行善掣<sup>上下</sup>脚下痛是為脾氣之實也

則宜寫之脾氣不足則四支不用後泄食不化<sup>飢</sup>逆

勝<sup>心</sup>鳴是為脾氣之虛也則宜補之

刪繁方療脾虛寒勞損氣脹噫滿食不下通噫<sup>心</sup>消

食方 猪膏三升 宿薑汁五升 吳茱萸一升 白朮

一升 搗茱萸等二物為散內薑汁膏中更取六升燂酒

心腹及飽滿氣也

進方寸匕日再服

千金方治脾實契<sub>ハナハナ</sub>台本<sub>ハナハナ</sub>強直或

夢歌樂而體重不能行<sub>ハナハナ</sub>寫契湯方

並胡<sub>ハナハナ</sub>三<sub>ハナハナ</sub>分

伏苓三<sub>ハナハナ</sub>分

玄<sub>ハナハナ</sub>參二<sub>ハナハナ</sub>分

大<sub>ハナハナ</sub>青二<sub>ハナハナ</sub>分

龍<sub>ハナハナ</sub>膽三<sub>ハナハナ</sub>分

細<sub>ハナハナ</sub>辛三<sub>ハナハナ</sub>分

杏仁四<sub>ハナハナ</sub>分 芒<sub>ハナハナ</sub>消三<sub>ハナハナ</sub>分 苦竹葉切一升 九味水九升

煮取三升分三服

槎<sub>ハナハナ</sub>要方療脾<sub>ハナハナ</sub>契<sub>ハナハナ</sub>內<sub>ハナハナ</sub>契<sub>ハナハナ</sub>脣<sub>ハナハナ</sub>痿<sub>ハナハナ</sub>渴<sub>ハナハナ</sub>多<sub>ハナハナ</sub>腫<sub>ハナハナ</sub>身<sub>ハナハナ</sub>重<sub>ハナハナ</sub>方<sub>ハナハナ</sub>生<sub>ハナハナ</sub>地<sub>ハナハナ</sub>黃

五兩<sub>ハナハナ</sub>槁<sub>ハナハナ</sub>之以水<sub>ハナハナ</sub>絞<sub>ハナハナ</sub>取<sub>ハナハナ</sub>汁<sub>ハナハナ</sub>漬<sub>ハナハナ</sub>梅<sub>ハナハナ</sub>蜜<sub>ハナハナ</sub>和<sub>ハナハナ</sub>服<sub>ハナハナ</sub>之

又方取<sub>ハナハナ</sub>芥<sub>ハナハナ</sub>菜<sub>ハナハナ</sub>汁<sub>ハナハナ</sub>一升一服

又方<sub>ハナハナ</sub>麥<sub>ハナハナ</sub>門<sub>ハナハナ</sub>冬<sub>ハナハナ</sub>汁<sub>ハナハナ</sub>服<sub>ハナハナ</sub>之

廣<sub>ハナハナ</sub>洛<sub>ハナハナ</sub>方<sub>ハナハナ</sub>主<sub>ハナハナ</sub>脾<sub>ハナハナ</sub>胃<sub>ハナハナ</sub>中<sub>ハナハナ</sub>契<sub>ハナハナ</sub>渴<sub>ハナハナ</sub>欲<sub>ハナハナ</sub>得<sub>ハナハナ</sub>飲<sub>ハナハナ</sub>冷<sub>ハナハナ</sub>水<sub>ハナハナ</sub>不<sub>ハナハナ</sub>下<sub>ハナハナ</sub>食<sub>ハナハナ</sub>方

茯苓四兩 甘草二兩 石膏五兩 地骨白皮三兩

第根切一升 切水八升煮取二升五合絞去滓

分溫三服忌契麴契肉海藻猪蒜

僧深方溫脾湯治脾氣不足羸弱下利上入下出方

干薑三兩 人參二兩 附子二兩 甘草三兩 大黃

三兩 凡五物切以水八升煮取二升半分三服應

得下去毒實甚良

治肺病方第十三

病源論云肺氣盛為氣有餘則病喘欬上氣胸背痛

都館及足跟也

汗出尻陰股腠<sub>コムラハキ</sub>踰<sub>ヒ</sub>胫<sub>ヒ</sub>足皆痛是為肺氣之實也則宜

寫之肺氣不足則少氣不能報息耳聾<sub>ヒ</sub>嗌乾是為

肺氣之虛也則宜補之

千金方治肺虛寒<sub>ヒ</sub>之小腸拘急腰痛<sub>ヒ</sub>羸<sub>ヒ</sub>瘠<sub>ヒ</sub>百病<sub>ヒ</sub>連

中湯方 大棗<sub>ヒ</sub>枚 干薑三兩<sub>ヒ</sub>芍藥<sub>ヒ</sub>兩 甘草三兩

桂心三兩 五味<sub>ヒ</sub>承八升<sub>ヒ</sub>煮取三升<sub>ヒ</sub>去滓<sub>ヒ</sub>內<sub>ヒ</sub>枳<sub>ヒ</sub>八兩<sub>ヒ</sub>煮三

沸分三服

又<sub>ヒ</sub>治肺實<sub>ヒ</sub>則<sub>ヒ</sub>胃<sub>ヒ</sub>滯<sub>ヒ</sub>作<sub>ヒ</sub>息<sub>ヒ</sub>泄<sub>ヒ</sub>氣<sub>ヒ</sub>除<sub>ヒ</sub>熱<sub>ヒ</sub>方

枸<sub>ヒ</sub>杞<sub>ヒ</sub>根<sub>ヒ</sub>皮<sub>ヒ</sub>二升<sub>ヒ</sub>白<sub>ヒ</sub>前<sub>ヒ</sub>三兩<sub>ヒ</sub>石<sub>ヒ</sub>膏<sub>ヒ</sub>八兩<sub>ヒ</sub>杏<sub>ヒ</sub>人<sub>ヒ</sub>三兩<sub>ヒ</sub>橘<sub>ヒ</sub>皮<sub>ヒ</sub>五兩

白朮五兩 赤蜜七合 六味水七升 煮取二升 去滓下蜜

剪兩三沸分三服

治腎病方第十四

病源論云腎氣盛為志有餘則病腹脹食泄體腫

喘欬汗出面自黑小便黃是為腎氣實也則宜傷之

腎氣不足則厥腰脊冷胃內痛耳鳴苦聾是為腎

氣之虛也則宜補之 千金方治腎虛寒陰萎脊

腰痛身重緩弱言音混濁陽氣頓絕方

生地黃五斤 千 縱容八兩 白朮八兩 巴戟天八兩 麥門



冬八兩 伏苓八兩 甘草八兩 牛膝八兩 五味子八兩

井ノクハナ

七ネカハナ

車前子五兩 杜仲八兩 干薑五兩 十二味為散

ヒナナ

食後酒服方寸匕日三

ハナトケ

又之治腎實熱脹滿四支正黑耳聾夢腰脊離解夢

伏水等氣急寫腎湯方 大黃三兩 伏苓三兩 甘草二兩 生地黄五兩 甘

キナナ

水一升蜜器中宿漬碎如雀頭大

生地黄五兩 甘草二兩 伏苓三兩 葱白八兩 昌蒲五

ヒナナ

オシク

アラネク

キノネ

兩 黃芩三兩 玄參四兩 細辛二兩 芒消三兩

十味以水九升煮八味取二升五合去滓別漬大黃

三升

クハナ

內藥中更煮取二升三合去大黃滓下地黃汁微

大煎一兩沸下芒消分三服

耆婆方治腎氣虛則夢使人見舟舩溺人冬時夢見

伏水中及在水行若有恐畏惡人見腎氣盛則夢見

腰脊兩解不属不<sup>ハカ</sup><sub>ハカ</sub>厥氣客於小腹則夢聚邑街衢<sup>道也</sup>

方秦膠石酹澤馬防風人參<sup>各一分</sup>伏苓黃苓

干地黄遠志<sup>各八分</sup>

十味切搗篩為散以酒服方寸匕日二

治大腸病方第十五

病源論云大腸氣盛則為有餘則病腸內切痛如錐

刀判無休息ハル胛背寒痺カサナリ寧急縮也是為大腸之氣實也

則宜寫之——大腸氣不足則寒氣客之善世

是為大腸氣之虛也則宜補之

千金方治大腸虛寒利下青白ハシ腸虛鳴相逐オク黃連補

湯方 黃連四兩 伏苓三兩シムナカハラ芍藥三兩ハキ酸石榴皮

五具 地榆五兩モロハネ 伏龍肝カハハナ鷄子一枚大 六味切水七升カ煮

取二升五合去滓下伏龍肝クタイカヤ屑攪ミミシ調分三服 又治

大腸實契腸脹不通口生瘡生薑泄腸湯方

宿薑三兩ハシカミナフルチ 橘皮三兩 大棗十四枚 青竹茹三兩カハ

生地黄十兩 桂心一兩 黃芩三兩 艾子人三兩 伏苓  
二兩 白朮三兩 芒消二兩 十一味切水七升 煮取三升  
去滓下芒消分三服

治小腸病方第十六

病源論云小腸氣盛為有餘則病小腸契雄竭于  
治少腹脹是為小腸之氣實也則宜瀉之小腸不  
足則寒氣客之而腸病驚跳不言アルトキハ下アルトキハ去是  
為小腸氣之虛也則宜補之

千金方治小腸虛寒痛下赤白腸滑腹中懊アハタム懷タム懷タム  
慄也

補湯方 干薑三兩ヤナセリ 當歸四兩キハタ 黃蘗四兩エヒル子 地榆皮

四兩 黃連三兩ニカハ 阿膠三兩 石栴皮三兩

七味水七升トイテ 煮取二升五合アルテ 去滓下膠ナリ 煮烱分三服

又治小腸實並ノセリ 契脹口瘡ナリ 紫胡寫湯方

紫胡三兩並ノセリ 橘皮三兩ナリ 黃芩三兩ナリ 澤芎三兩ナリ 枳實三

兩カニホ 旋伏花三兩トリノアノクセ 升麻三兩ナリ 生地黃切一升ナリ 芒消三兩ナリ

九味切以水斗ナリ 一煮取三ナリ 去滓下芒消分三服ナリ

治膽病方第十七

病源論云膽氣盛為有餘則病腹內冒干也安也 不安身軀去廷又體也

莫報又



習タレ是為膽氣之實也則宜寫之徒瀉及水搖又動也此ノ上ト膽氣不足其氣上

溢三十而口苦善大息合イ臨宿汁心澹徒瀉及水搖又動也此ノ上ト如人時補之ノ合盜中物寒味也

之ハ酸唾是為膽氣之虛也則宜補之

千金方治膽府實契精神不守シヤ此寫契ホソクア半夏十里水

湯方ホソクア半夏三兩合イ酸棗ホソクア五合ホソクア黃芩一兩遠志二兩

茯苓二兩宿薑三兩ホソクア生地黃ホソクア五兩ホソクア凡八物ホソクア細切取長

流水五斗先煮秫米令蟹目沸カニ揚之ホソクア三千過ホソクア澄清

取六升ホソクア煮藥取二升ホソクア分三服

治胃病方第十八

病源論云胃氣盛為有餘則病腹脹氣滿是為  
胃氣之實也則宜瀉之胃氣不足則飢而不食穀  
食泄瀉遂是為胃氣之虛也則宜補之

千金方治胃虛冷少氣口苦身ニカク體無澤マルキ補胃湯方

防風二兩ハナカサ栝子人二兩ヒノア吳茱萸三兩カラスシガア細辛兩アラノネキヒ甘草

兩桂心二兩橘皮二兩ラムナカウラ芍藥二兩ラムナカウラ人參三兩ニテル凡九味

切以水一斗煮取三升分三服又主治胃實ミテル胃氣熱湯

方支子人三兩日不芍藥四兩カラハアキ白朮五兩カラハアキ茯苓二兩生地

黃汁一升夜干三兩升麻三兩赤蜜一升

八味切以水七升煮取一升五合去滓下地黃萸肉

沸次下蜜葵取三升分三服老小以意

音旁 音光

治膀胱病方第十九

上ハリフクロ

病源論云五穀五味之津液悉歸於膀胱氣化分入

血脉以成骨髓也而津液之餘者入脬則為小便不通

ナル

アトリアルハ

玉補受衣

ナル

音下也

小腹偏腫痛是為膀胱氣之實也則宜寫之勝

膀胱也

脫氣不足則寒客之胞滑小便數而多也面黑是

膀胱氣之虛也則宜補之

千金方云旁光

オセ

セム

病者少腹滿腫而痛以手按則欲小便而不得

又云治旁光腎冷飢不欲食面黑如炭方慈石六兩

黃耆ヤハフクセ三兩ヤハフクセ枳中ヤハフクセ四兩ヤハフクセ白石莫セネカハ五兩セネカハ五味セネカハ四兩セネカハ伏苓セネカハ三

兩セネカハ木五兩セネカハ七味水セネカハ九升セネカハ煮取三升分三服又云治旁光

實熱方支子セネ人三兩セネ石膏シライシ八兩シライシ伏苓セネ三兩セネ淡竹葉アハタケノハ

切一升セネ生地黃セネ切一升セネ蜜一升ヤトコロ知母ヤトコロ三兩ヤトコロ七味水セネ

升セネ煮取二升セネ去滓下蜜煮兩沸分三服ヤトコロ須臾ヤトコロ加薑ヤトコロ漬

三兩

治三焦病方第廿

病源論云三焦盛為有餘則脹氣滿於皮膚內輕然

而不<sup>カクカラ</sup>牢或小便<sup>シフリ</sup>澁或大便<sup>ナリ</sup>難是為三焦之實也則宜寫

之三焦氣不足則寒氣客之病遺尿或泄利或胃

滿或食不消<sup>セ</sup>是三焦之氣虛也宜補之

千金方之三焦病者脹氣滿小腹<sup>三千</sup>尤堅不得小便<sup>急也</sup>窘

急溢則為水<sup>二トギハ</sup>田<sup>トギハ</sup>則為腹脹又治上焦<sup>香下也</sup>虛寒短氣

語聲不出黃耆理中湯方黃耆<sup>ヤハテクセ</sup>二兩桂心二兩

丹<sup>唐</sup>參四兩桔梗三兩乾薑三兩五味子三兩伏苓

三兩甘草三兩杏仁四兩芎藭三兩十味切以水

九升煮取三升分三服又治上焦實契腹滿



而不欲食或食先吐而後下時後胃痛ヒキ麥門冬

理中湯方 生麥門冬ヤブハク二升 生薑四兩 甘草二兩炙

三兩 伏苓二兩 橘皮三兩 竹茹タケノサ一升 生蘆根切一升

尊心スナハ五合 麴米フルキヨ一升 白朮五兩 萎蕤ヒメマユ三兩

十二味切水一斗五升煮取三升分三服

又治中焦實熱開也相拒也開格不吐不

下腹下腹欬喘急急大黃シヤシ寫契キ開格カク通障カク絕九味湯方

蜀大黃三兩切水一升 黃芩三兩五合別漬 澤陽カノ三兩 升麻三兩

零羊角四兩 支子人四兩 生地黃汁一升 生玄參八兩

芑消三兩 九味以水七升煮八物取二升三合下大黃更

煎數沸オカイ紋去黃滓キナカ下芑消分三服ホリキ

又治中焦虛寒洞泄シ下利シ或因霍亂後寫コト黃白無

度腹中虛痛シ黃連シ煎方 金色黃連四兩黃蘗三兩

當歸ウイセリ三兩厚朴三兩乾薑三兩シ酸石榴皮四貝シ地榆シ

四兩阿膠シ四兩八味以水九升煮七物取一升去滓下

阿膠更煎取トム烱シ分三服 又治下焦虛寒シ楨シ或

便轉シ後見血シ此為近血或利下シ或不利好日勞シ冷而シ

發續シ新止血湯方 續シ新三兩ヤチセリ當歸三兩干薑四兩

甘草一兩乾地黄四兩桂心三兩 六味切以水九升煮  
八物取三升五合去滓下阿膠更烱取膠トイ洋トイ盡下補  
黃分三服 又云治下焦契大小便利不通紫胡世

寒宜本

通塞湯方

紫胡シヤリ三兩黃芩三兩 橘皮三兩 澤馬ナニ三兩

炙子人四兩石膏六兩シヤイ 零羊角三兩碎 生地黃

切一升 香豉一升 葵 芒消三兩 十味以水一斗

煮九物取三升去滓下芒消分三服

治氣病方第廿一

千金方治氣極虛寒皮毛焦津液不通羸勞百病

氣樹黃耆湯方 黃耆ヤハラクセ四兩 人參二兩 干棗十枚去核

生薑八分 白朮二兩 桂心二兩 六味切以水八升煮取三

升分四服 又主理氣丸治氣不足方 杏仁一兩 益

智子二兩 廉薑二兩 桂心一兩 四味丸如梧子末食服

三丸以知為度

治脉病方第廿二

千金方治脉虛驚跳不定乍來乍去主小腸府寒補

調中防風丸方 防風十二分 桂心十二分 通草十二分

伏苓一名一

伏神十二分 遠志十二分 甘草十二分 人參十二分 麥門冬

十二分 白石莫十六分 九味鳩諦為散 白蜜和丸如梧子

酒服十九日 再加至十為劑 又治脉實滿主心契

病并麻湯方 蜀并麻三兩 文子人三兩 生地黃切一升

子苓三兩 澤陽三兩 淡竹葉三兩 芒消三兩

七味以水九升 煮取三升 去滓下芒消分三服

治筋病方第廿三

刪繁方治筋虛實暴損絕極或因霍亂轉動腹

滿並轉痛或因服藥吐利過甚脚平虛轉腹轉痛



席口者  
一握也

人參湯方 人參二兩 厚朴二兩 薤白一席口 白朮四

兩 藜一把 長三寸 五物切以水五升煮取二升去滓分再服

又云治轉筋霍亂後因而筋轉方 取絮巾若綿矣 息撮及

煖以縛筋上 又云胞轉筋急方 白朮四兩 香豉 麻景云新絮也武玄云析泥

一升 葵子二兩 榆白皮三兩 子芩三兩 通草二兩

伏苓二兩 七物切以水七升煮取三升去滓分三服

又云治轉筋陰囊外縮入腹中絞痛從交按極

損所為方

取化子一頭 杖撞廿下 放於中逐之使啼極刺腸

下取五升以酒一升共和飲之若無酒單五升好勿令

冷凝也

又云治交接損縮卵勸瘰癧方燒婦人月經

衣服方寸匕

已上千金方固之

又云治轉勸十指勸瘰癧急不得

屈伸別法

灸手踝上七炷大良

又云治轉勸脛骨

痛不可忍方

灸胛膝下廉橫勸上三炷

又云轉勸方

灸湧泉、在脚心下當母

指大勸是灸七炷

又方灸大都、在足母指大

節內側白肉際七炷

又云腹脇轉勸方灸脊上

一寸十四炷

又云治勸絕方雙胞足髓焚內瘡中

筋即續矣ハカル

千金方治筋實極手足爪甲或青或黃或黑或赤筋急

煩ハナ地黃ハナ方地黃汁三升生葛汁一升生玄參汁一升ハナ

大黃二兩安子三兩升麻ハナ三兩石膏ハナ五兩夕藥四兩

麻黃ハナ三兩犀角三兩十味水七升煮七物取二升去滓下

地黃汁兩沸次下葛汁等煎取三升三服

治骨病方第卅四

那繁ハナ方云凡骨虛實之應主于腎勝脫若其府藏

有病從骨生熱則應藏寒則應府ハナ凡骨虛者疼

痛也云云及骨節疼也

不安好倦骨實者苦煩契 又治骨實苦煩契

鷄子白契方 通四時用 鷄子七枚 和同取白 生地黄汁一升

麥門冬汁三合赤蜜一升凡四汁相和攪調微火上

煎之三沸分三服 搗要方療骨虛勞冷骨節疼

痛無力 方シキ 二升地黄八兩再遍蒸曝乾從食後以酒

一升服之 并 治虛契

治髓病方第廿五

那繁方云凡髓虛實之應主于肝膽若其府藏有

病從髓生契則應藏寒則應府 トハ 凡髓虛者病



惣不定ヤ髓實者ル剪ル髀ル又云治髓實剪髀ル

肝契紫胡ル菰泄湯方紫胡ル三兩升麻ル三兩黃芩ル三兩

澤ル馬ル四兩細辛ル三兩枳實ル三兩淡竹葉ル切ル一升炙子

人ル三兩ル生地黃ル切ル一升芒消ル凡十物以水九升煮取三

升去滓下芒消分三服千金方治髓虛痛ル物ル不

安瞻府中寒ル羌活ル補ル髓九方羌活ル三兩桂心ル三兩

芎藭ル三兩當歸ル三兩人參ル四兩棗肉ル一升ル研為脂

大麻子ル人二升ル為脂ル羊髓ル一升蒜ル一升牛髓ル一升十味

前ル鳩五種干藥ル為散ル下來膏麻人ル更鳩相ル濡ル為一



家下二髓內銅鉢中湯中煎之取好為丸ツケ如梧子酒服卅九日再加至卅九

治皮病方第卅六

肺也

椰繁方言凡皮虛實之應主干肺大腸其病茲於皮毛トキハ熱則應藏寒則應府凡皮虛者寒皮實者熱又主治皮虛主大腸病寒氣ヒル用格カク蒟藳並湯方

蒟藳根ソクダク莖切三升ハク桃枝菜ハク剉三升ハク細糠一斗ハク林米ハク五升ハク

昌蒲根ハク莖剉二升ハク凡五物水一石五斗煮取米熟為度

大瓮ハク器貯瓮上作少竹床ハク子置瓮人身坐床中四面

此特法

カコフ

周迴將麝席圍身上以衣被蓋覆若氣急時用孔對

中泄氣取對通才接汗可作兩人食久許如中三日差還

燭葉足汗用之若氣裏不過契瓮下置炭火也非但

治寒法是皮膚一切芳冷並皆治之

又云治皮實主肺病契氣所加支子藥方

支子人三兩セネ生地黃切一升カヲタチ枳實三兩シライシ石膏八兩ハトクセ大青

三兩杏人三兩アタケイム淡竹葉切一升ノセリ紫胡三兩オモクセ生玄參五兩

芫消三兩凡十物切以水九升煮取三升去滓下芫消

平旦分三服已上千金方同之

治完病方第七

那繁方云凡完虛實之應主脾胃若其府藏有病從肉生熱則應藏寒則應府

凡完虛者坐不平席身危動完實者坐平不動需氣

又云治完虛坐不平席好動主胃病寒氣所加五茹酒

方通四時用五茹皮二升五茹芍藥皮二升芍藥干地黄八兩丹參八

兩杜仲一斤干薑四兩附子三兩炮鍾乳一升一升研

凡八物吹咀橙子貯之清酒二斗漬之三宿一服七

合日再服又云治完實坐平席不動喘氣主脾病熱

吹咀鹿搏  
之義也又  
搏之如大  
豆也

氣格半夏湯除常方通四時用半夏八兩洗宿薑八兩

細辛三兩杏仁五兩橘皮四兩麻黃三兩石膏七兩

碎夜干二兩凡八物切水九升煮取三升去滓分三服

須利下加芒消三兩

醫心方卷第六

醫心方卷第六札記

二頁上

胃痺

仁和尚寺本 作胃下

九再服

仁和尚寺本 作一井

三頁下

行

膈痛

仁和尚寺本 膈作痛

四頁上

病發

仁和尚寺本 病作痛

下

七

三服

仁和尚寺本 此下有又方三井湯一斗以鹽一井 舍境飲之若無火以作湯仍可用水二十六字

又方切生薑

原本五字塗抹 仁和尚寺本 抹

五頁下

人參一方

仁和尚寺本

此以

七頁上

有年壯

有恐隨 之壞字

廿頁下

石斛

斛即解 之俗案

晉書音義云斛與斛同 斛並斛之或體

廿六頁上

大少便

千金少 作小

廿八頁上

又方

據前後文方 蓋云之訛

八腹腸

腸字 恐行

廿九頁上

九髓虛

者病惣不定髓實者勇

幹

十金作髓虛者腦痛不安髓 實者勇悍案幹即幹之俗體



此蓋假  
為悍也  
幹

下世  
四九  
行真

芒消

乳雨缺干  
金作三兩

五  
行  
瘡  
慙

腦千金作痛

七行注

為脂

千金作如脂

七世  
行頁上

桃枝菜

菜菜

上世  
四一  
行夏

牙危動

危燒動

身

醫心方卷第七

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治陰瘡方第一

治陰蝕瘡欲盡方第二 治陰瘡方第三

治陰莖腫痛方第四

治陰囊腫痛方第五

治陰明腹痛急痛方第六

治陰囊濕痒方第七

治陰類方第八

治脫肛方第九

治穀道瘡方第十

治穀道赤痛方第十一

治穀道生瘡方第十二

治濕瘡方第十三

治疳瘻方第十四

治諸痔方第十五

治九虫方第十六

治三虫方第十七

治寸白方第十八

治蛔虫方第十九

治繞虫方第二十

治陰瘡方第一

時忌及

病源論云腎營於陰腎氣虛不能制津液則汗濕

虛則為風耶所乘耶容湊理而正氣不泄耶心

相干在皮膚故瘡搔之則生瘡 葛氏方治男子

陰瘡爛方削黃蘗煮以洗之日十過又方狼牙草

根煮以洗漬之日五六過今案極要方狼牙二把水四升又方連黃

黃蘗外等搗以肥猪涎汁煮之去滓以漬之復搗

此二物絹袋下以粉瘡日五六又治陰蝕瘡又方

黃地榆以洗漬之合甘草尤佳 范汪方治人陰

頭新生瘡方 無菁一杞切水煮令熟食之

樣要方療陰瘡方 黃連三分 胡粉一分 麝黃キハダ

三分 為散トク傳瘡上 集驗方云陰惡瘡方以蜜

煎甘草末塗之良 又云陰頭生瘡如安石榴

花大者如捲方 帚牙犀角刀刮末以猪童トナリ合セ變セ色

去津日三塗 又方以烏賊魚骨末粉之良

又方カハカメ蟬甲燒末以鷄子白和傳之 隨時方治陰

惡瘡方 取薤白ニラ和オホミツ蘘傳之當日即差

千金方治陰生瘡方 地榆八兩 黃蘗八兩 二味以水

一斗五升煮取六升去滓適冷暖用洗瘡日再又云

妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並化

甘瘡治大痛方用銀釵綿纏臘月猪脂薰火上

暖以釵烙瘡上令熟取干槐枝葉塗之以麝香

黃檗青檗朱付上小便後即付之不過三錄驗方治

陰頭瘡腫轉困篤方黃連汁黃蘗龍膽汁

凡三物合得半升別煮脂蹄汁二升合和署筒炙

灰上溫之漬陰日三醫門方療男子陰瘡

方黃蘗狼牙水四升煮取一升半去滓



敗瘡也  
膿如蟲  
食肉  
木之葉

射者瘡

浸瘡數洗了末地床子黃連ヒトコシロ傳瘡中ハツク

令李方治陰勞創生息肉ナシ破痛タシ醫所不能バカヨ

治樊石散方 樊石一分燒細ミヅノネクセ辛一分白芷カサモナ一分凡三

物治ハナ後以溫水洗創乃粉ハナコ

治陰蝕瘡欲盡方第二

葛氏方治陰蝕瘡欲盡方 取ヒキカニ蝦蟇タマシ莞矢タマシ分等タマシ

搗勤瘡上 范汪方治陰腫生創至盡方 釋トイ

胡粉ヌル塗良ヌル又方ハナ款葉ハナ作灰傳之 又云男子陰頭生

瘡精食ユカ蟹欲盡方 當歸ヤエウリ夕藥エヒルク黃芩ヒツシキ木射香オケノコ

瘡

二

白粉ハフニ 為湯ハクチ一洗ハ 令李方治陰蝕蒲黃散方

蒲黃カテノハナ二兩 桐皮キリウカハ二兩 甘草二兩 凡三物ツケ搗ミ篩シ粉ミ創

上不過三愈 千金方治陰蝕瘡方 以肥猪ツケ肉水

三升煮肉令極爛タヒ去肉以湯令極稠タヒ契便以灌イル瘡中

即愈 又方雄黃スエ二分 礬石スエ二分 燒タヒ麝香スエ半分 三味スエ篩

以粉瘡上 治虫食人陰莖并囊フタ欲盡方 燒タヒ鯉

骨為灰和黃蘗汁塗之 又方燒鮓魚和醬ミソ塗之

治陰瘡方第三

病源論云夫虛勞損腎氣不足故陰冷汗液自泄モル風

耶乘之則搔瘡 錄驗方治陰癢瘡瘡多少有汁

者方煮黃蘗汁冷洗漬傳ツケ蛇床子ヒルムシロ黃連末ツケ

新錄要方治陰痒水出不能羸者方干薑末ツケ

又方水煮蕪菁子ナクネ洗并末粉上ツケ又方杏仁カラモ、ツケ燒取

油塗之 又方水煮棘針ナツメハシ洗之 又方水煮桃皮ハナ葉洗

之 又方取薤白ミラノネ鵝汁オホミラ塗之 又方灸脊窮骨キナカウ名龜尾依

年壯或七壯又灸足大指叢毛中多セ至七壯並良

槎要方治陰痒カエク濕生瘡カエカリ歷年トモ不羸方桃核中人モ、ツケ燒

末服七枚日三服廿五枚三日愈 又方嚼胡麻カマ傳ツケ蘗ニ

過四五度愈

龍華方治男子陰下創癢濕方

白粉ハクニ一分

干薑三分

牡蠣シカキツカヒ三分

三物下篩欲卧時粉丸フミト

夜三四粉之効驗方牡蠣散治男子陰下痒濕方カエリウツフ

牡蠣三分干薑三分凡二物下篩以粉日二僧溲方

治陰下濕痒生瘡方吳茱萸カラハカア一分凡一物以水三升

煮三沸以去滓カレ洗瘡愈又方補黃粉カアハナ瘡上日三過即

愈又方甘草一尺凡一物水五升煮取三升洗漬之日三

便愈神良者婆方治人陰下痒濕方蛇床子ヒルシロ作末和

米少粉コ少粉コ刑繁論治陰生濕瘡包用石流黃ユワウ末



傳カ集驗方治大人小兒陰莖痒カ汁出方取生大豆

刮去皮ユ熟カ爵塗之カ本草拾遺云牡蠣殼カ和麻黃カ

根地床子干薑為粉去陰汗

治陰腫痛方第四

病源論云陰腫カ候此由風熱客於腎經流於陰器

腎虛不能宣散故致腫カ范汪方治卒陰腫欲死方

急服下藥使大下即佳カ又方末烏賊魚骨粉カ又方

末地床子和鷄子黃傳之カ葛氏方治陰莖頭急腫生

瘡汁出方カ濃煮黃蘗汁管中漬之カ又方濃煮水楊



萊管中溫漬之下ノカシ 又方當歸三分ヤノキ 黃連三分アノキ 小豆一分

凡三物搗篩以粉上ボコ 又方杏仁カノモウ 鷄子白セネ 和塗之 又方

燒豉三粒ス 末傳之 又方以白蜜塗之 又方燒牛矢ウノクク

末和苦酒塗之ル 又云陰莖忽腫痛不可忍方 雄黃

燬石各二兩甘草三尺水二斗煮取二升ル 以漬之 又云治率

陰痛如刺七ルカ 汗出如雨方 小蒜コヒル 一升 薤根一升 楊柳根

一斤 石三物合燒ル 以酒灌之 及熱下ノカシ 以氣蒸陰十ル 千金方千金方 千金

方治陰腫痛方 搗薤菜根付之ヒユ 又方酒服桃人

末ル 淨丸大三服 又云玉莖痛方 甘草石蜜末和乳

洗之龍華方治陰頭腫潰敗壞方甘草一分

烏頭一分夕藥一分敗醬二分四物切以水四升煮

取三升洗之日三治陰莖頭腫生創黃汁出方

干薑末搗傳上不過再三即愈新錄單方

陰腫痛方搗桃人為泥和水若酒塗之數易寒心

又方末蔓菁子并根封之枕中方治男子陰腫方

以竈中黃土以酒和之塗其上立愈有驗

治陰囊腫痛第五

千金方治陰囊腫痛方酢和麵塗之又方酢和

所慰之 又方釜月下土鷄子白和付之 葛氏方治男

子陰卵<sup>（ハナ）</sup>卒腫痛方 燒牛矢末以苦酒和傳之 又方

蛇床子末鷄子黃和傳之 又方鳩藍青<sup>（スル）</sup>塗之 又方

灸足大指第二節橫文理<sup>（ハ）</sup>中央五壯佳 醫門方治

陰卵腫方 以桂心末塗之佳 又方末大黃和酢塗之並

佳 又方取皂莢<sup>（カハラスチ）</sup>炙去<sup>（アウチ）</sup>皮子末和水塗之立消又云

療卒陰卵腫疼痛不可忍方 灸足大拇指頭去<sup>（オホミ）</sup>

爪甲如薤葉隨年拉右核腫灸左右腫灸左兩核

俱腫俱灸之一宿愈 又方以玉華<sup>（カヒラ）</sup>頭向下正囊<sup>（タス）</sup>雖

點莖頭當縫上灸三粒或七粒即消 博洛安衆方

治久半玄卑濕冷瘰忽陰囊虛氣上藥人方

右以米醋炒黑豆青布裹慰心腹 集驗方治卒

甲腫方 醵鴆桃人付之力分八燂則易亦治婦人陰腫

玄女經云療男子陰甲腫方 取鴆桃人去皮尖并トカリ商

除ルチ雙フタツギ人イリ焚令色變作オス末九如彈丸酒服之

治陰甲入腹急痛方第六

葛氏方治陰九卒縮入腹急痛欲死名曰陰疝音ハ方

狼毒ヤナクヒ四兩防葵ヤナナヒ一兩附子フシ二兩 右三物蜜丸服如梧キリヲ子



三九日夜三過 玄女經療房勞<sup>レ</sup>脚腫<sup>ハツム</sup>或縮入<sup>ツマ</sup>腹

中絞痛<sup>コトク</sup>或便氣絕死方 取婦人經月布衣

有血者湯洗<sup>エソク</sup>取汁服之<sup>今葉醫門方為灰酒服方寸匕</sup> 又方取婦人

陰上毛二七莖燒作灰以井華水服之

治陰囊濕痒方第七

葛氏方治陰囊下濕痒<sup>ハツム</sup>皮剥<sup>ハク</sup>方 酸漿<sup>ホニキ</sup>煮<sup>タタ</sup>地榆根

及黃蘗汁洗皆良 又方栢菜<sup>ヒメ</sup>塩各一升合煎<sup>ハツ</sup>以

洗之畢取蒲黃<sup>カキ</sup>傳之 又方煮槐枝<sup>ハツ</sup>以洗之 又方

爵<sup>カム</sup>大麻子傳之 又方濃煮<sup>コク</sup>香薷<sup>イヌアサギ</sup>洗之 醫門方



療陰囊下濕痒搔破水出乾即皮剥起方カハハヤシ地榆エヒルキ

黄蘗地床子各三兩槐白皮切一升水七升煮取三升ヒムシロ

暖以洗瘡日三四度勿食炙鮮ツマシ玉房秘決云治ツマシ

陰囊下濕散方カハハヤシ麻黄三兩地床子二兩エヒルキ藥三兩

黄連三兩ツマシ棗米一升一握也搗末粉之又方干薑黄連

杜厲各五棗米八升一握也搗節以粉之又方ハコ未菴ハコ蔞ハコ

子傳之

治陰頰方第八釋名陰腫曰頰氣下頰

病源論云頰病之狀陰核腫大有時小歌トキ時終ヤムコト

大於常勞於陰兩便發、則脹大使人腰脊痠急  
身體惡寒骨節沉重此病由於損腎也足少  
陰之經腎之脉也其氣下通於陰、宗脉之所  
聚積陰之氣也勞傷舉重傷於少陰之經其氣  
下衝於陰氣脹不通故成類也 小品方牡丹五  
等散治類症陰甲偏大有氣上下脹大行走腫大  
為妨脹此方良驗 牡丹去心 防風桂心炙 芍藥  
各一分凡五物治下篩酒服一升圭上廿日愈  
治少小類症最良嬰兒以乳汁和如大豆与之

長宿人服方寸匕 又云男顏有腸顏眦脹有水

顏氣顏四種腸顏眦脹難老氣顏水顏針灸則

易老也 又云男陰眦偏大顏方 灸肩井并灸南

元百壯 又方灸玉泉百壯在南元下一寸又方灸足

大陽五十壯并灸足大陰五十壯有驗 又云顏病

陰卒腫者方 今並足縛兩大指令爪相<sup>ナラハ</sup>近以艾丸灸

兩爪端方角處一九令頻在兩爪角上也令九半上<sup>ホタ</sup>

爪上佳灸七壯愈已上千金方同之千金方云卵偏

大上入腸方 灸三陰交在內踝上八寸隨年壯

又云治顏方

取楊柳枝如肺大指大長三尺ナレ寸投水

煮令契キ以故布ミ及氈掩腫處取契枝更カハヤ牙柱ヒツ之

如此取老又云顏疔ヘリ偏大氣上下脹方牡丹一分

防風一分二味酒服方寸匕日二葛氏方治人起躍

舉重卒得陰顏方灸兩足大指外白宗際陷クネナリ

中令艾丸半在爪上半在宗上七壯范注方又方以蒲

度口廣倍ハカリ之申度以約小腹中大橫ヨユ理令中央正對

脊乃灸兩頭及中央三處隨年壯善自養勿言笑

勞動千金方又方白朮五分地膚子十分桂心三分

右三物搗末服一乃佳曰三

治脫肛方第九

病源論云脫肛者肝門脫出也多由久利大腸虛冷所

為大腸虛而傷於寒利而用氣唾其氣下衝則

肛脫出目謂脫肛也 千金方云脫肛禁舉重急帶

新房室周年ナニシヤナリ乃佳 梅略方云脫肛慎舉重食

滑物急衣帶 小品方治脫肛驗方 補黃カチメ二兩

猪膏サソアヲ三合 凡二物搗合和傳ハス肛上當迫オス肉之不過

再三便愈 又方取女萎ヒメクモ一升火燒ヒタケ以烟熏ス肛即愈

醫心方卷之二

ト



葛氏方治卒大便秘肛方 灸頂上迴髮中百拉

又方猪膏和蒲黃オシイシ柞肉オシイシ但以粉之ツグ土佳 又方煮

石灰令契故綿裹之糸坐其上冷又易之并豆醬ヒビボ

漬合酒塗之 又云若腸隨肛出轉イタケヒコロ瘡不可入

者 鳩生カラシ枯樓カラシ取汁温アタタ以猪膏肉中手洗アタタ隨按

柞自得端ハナ縮入也 又方熬石灰令契布裹以

以熨之隨按令入 又方以鐵精粉之 千金方

治肛端直計又出壁去散方 故屋東壁立一外カシ碎カシ皂

玉篇曰

端

淺計使  
結二切

美三ハナ柱長一尺二寸二味鳩ハナ左為散ハナ施粉ハナ肛頭出

隱蔽兒

覆取皂莢炙後更逆熨之又云炙麻履底案入方

故敗麻履底一枚カクレタ散カクレタ頭一枚二味燒カクレタ散頭搗為

散付肛門帶出頭將履底案入即不出矣

又云治脫肛トモ歷年不愈方死散トモ頭一枚燒令烟絕

治作屑以傳ツク肛上ツク准以手按之今案本草拾遺云有以似為藥者

牛糞牛糞頭脫肛牛糞背燒未傳牛糞自縮此即牛糞類為藥也又方灸龜尾三愈即後窮牛糞

骨也又云治積冷利脫肛方枳實カシタ一枚

石上摩令滑澤カシタ鑽安カシタ把蜜塗炙令微煖カシタ熨之冷

更易之カフ又方鑽精粉上カフ內令入即愈又云病寒

醫心方卷二

二

冷脫肛方 灸臍中隨年壯 又云治脫肛出方

慈石四兩 桂一尺 楮皮一枚 灸令黃 合搗下篩服

方寸匕日一十服即縮 范汪方治脫肛方

生鐵三斤以水一斗煮取五升出鐵以汁洗上日三

醫門方療大腸寒則肛門洞寫指灸灸處文作溫切之中心小漏也又人脈判出方 欬頭一先灸針判之穴也

枚 燒令烟絕 鐵精一兩 梲節為散粉上令遍 又方取破

麻履底一枚 灸令綴契以履底按肛入即更不出

治穀道瘡痛方第十

病源論云穀道瘡者由胃弱腸虛則蟻虫下侵

穀道重者食於肛門輕者但瘰也

葛氏方

治下部痒痛如虫齧者胡粉水銀以棗膏和

調綿裹導之 又方杏人熬令黑搗取膏

塗之 又方高鼻蟻クワムシ燒末綿裹內孔中當大

蟬虫出 又方桃葉搗一斛蒸カニカリ內小口器中大孔

布上坐虫死 錄驗方若下部痒痛如虫齧者

小豆アヅキ一升好苦酒ル五升煮豆熟出干々復內酒盡

心末酒服方寸匕日三 徐伯方治穀道忽瘰痛

腫起欲生完突出方槐白皮六兩甘草三兩 凡



二物以豆汁煮漬故帛薄之契即易 新錄單

方治穀道中有虫痒者 艾三升水五升煮取二升

二服 又方諸肉灸令香通熨虫皆出 槌要方卒暴

冷下部疼悶方燒博令契大醋浹之三重布

覆坐上取差心 千金方 進集驗方治虫食下

部方 胡粉雄黃各等末著穀道中

治穀道赤痛方第士

集驗方治穀道赤痛方 莞系子熬令黃黑和以

鷄子黃以塗之 日三 又方取杏人熬令黃鳩作脂



塗之

治穀道生瘡方第十二

病源論云穀道肛門大腸之候大腸虛熱其氣衝

熱結肛門故令生瘡葛氏方治下部卒有創方

鳩蟬ヒクモムシ螬ヒクモムシ塗之 又方煮豉以漬之 又方豆汁以

摩墨導之 范汪方治下部卒有創若轉凍者

烏梅五十枚塩五合水七升煮取三升分三服

又方常煮シラクヌ舉皮飲之已上葛氏

治濕匿方第十三

治濕匿方第十三

病源論云濕<sup>ニ</sup>蠱病由脾胃虛弱<sup>ナリ</sup>為水濕<sup>ナリ</sup>所乘腹

內虫動侵食成蠱也 錄驗方治濕<sup>ニ</sup>蠱下部生瘡

方胡粉水銀黃蘗 凡三物治末粉等分合<sup>ル</sup>研水

銀散盡<sup>ニ</sup>傳創上又方常食猪<sup>ニ</sup>明腸食之佳

又方溫<sup>ハナシ</sup>弱令<sup>ハナシ</sup>契內小樊石以洗之 集驗方治<sup>ニ</sup>蠱

虫杏仁湯方杏仁五十枚苦酒<sup>ニ</sup>三升塩一合煮取五合

頃脹之令<sup>ハナシ</sup>木子方治<sup>ニ</sup>蠱虫及蟻虫侵食下部枯樓

散方 枯樓根四兩 亭<sup>ハナシ</sup>厯子四分凡二物治合下<sup>ニ</sup>殺

艾汁<sup>ヨモギ</sup>浸綿裹內下部中日三易 葛代方治穀道

蠶剉赤痛又痒方杏人熬令黑搗以綿裹導之

又方槐皮桃皮アヲチンア煉子チ合未猪膏和導又方菟糸チ

子熬令黃黑鷄子黃和塗導之。又方以棗膏和

水銀令相得長三寸十九綿裹宿導下部又方胡粉

雄黃分等末導下部イ內范汪方治穀道蠶瘡チ

赤痛又痒方イ搗チ鰕腸チ塗綿如指以導之虫出

治疳居耐又濕方第十四

病源論云人有嗜甘味多而動腸胃間諸虫致令  
侵食府藏此猶是蠶也但虫因甘而動故名之為

甘也其初患之狀手足燒疼腰脊無力夜卧煩躁

久熱不死也

モノ不化

煩心不欲言

昏々喜忌黑々眼淫夜夢顛倒飲食無味而失顏

色喜睡起則頭眩體重脛胫酸疼其上食五藏則

心内懊忪出食咽喉及齒斷皆生瘡出黑血齒色紫

黑下食腸膈下利黑血出食肛門生瘡爛用胃等

氣虛達則變區歲急者數日便死之緩者止沉

々嘿々支節疼重食飲減少面无顏色又去五

甘一是白甘令人皮膚枯燥面失顏色二是赤甘食

五藏令人頭髮焦枯三是蛻甘食人脊脊遊解行



五藏體重浮腫レ四是甘ア蜜ニ令人下部疼痛腰脊寧  
急五是里甘食人五藏多下里ニ而穀日即死又云面  
青顏赤眼元精光骨口焦ニ榮腹脹有塊日コトニナレ瘦損  
者是甘食人五藏至死ニ不覺又云五甘緩者則變  
成五垂千金方云論曰凡疳濕之為病皆由暑月多  
食肥濃油膩取冷睡眠所得ナリ之礼曰君子盛暑之月薄  
滋味元食肥濃煮コトニナレ起此所以不利人也養生者宜深戒戒  
又云治疳濕下里醫不能治垂死方麝香三分丁  
子香三分甘草三分犀角三分四味並細末コトニナレ合和



別以塩三合ハヒカフ柑三合カ或二合以水二升煮取一升去滓内

末散和合分作二服灌大孔且一灌酉時一灌又

云忌生冷酢滑但是油膩膈乳酪卅日慎之大

佳又云凡疳一切皆忌唯白飯塩豉首蓿荳蔻蕪

菁不在禁限錄驗方治甘濕方青箱二兩ウツヒクヌスアエケ梹二兩苦ク梹二兩

雄黄二兩上ホウ石留黄二兩ナラセハ狼牙三兩ウツヒクヌスアエケ蕪二兩ヒキセク雷丸唐一

二兩梨蘆一兩ヤスハナ凡八物搗篩取如杏人大内下部中也ハカリ

醫門方療疳瘻無問所在方取死蝦蟆燒作ヒキカヘル

灰以好醋ナキ和塗瘻上即愈救急單驗方療急蚘

八月採根乾之  
又念也

方無食子未腹內患者吹下部立驗

唐 似櫻

又方灌白馬尿一升虫惣出驗又方取文蛤燒灰和臘

イタカヒタル

月猪脂塗又方練樊右桂心徐長卿各等分未塗

ヒカアヌカモ

驗

### 治諸痔方第十五

病源論云諸痔者謂牡痔牝痔脉痔腸痔血痔也

ホ

ヒシ

牡痔肛邊生如鼠乳時々出膿血牝痔肛邊腫

ハ

ハリヤ

ホ

ヒシ

ハ

ハ

生創而血出脉痔肛邊生創瘡痛腸痔肛邊腫

ハ

ハリヤ

ホ

ヒシ

ハ

ハ

核痛發寒熱血出血痔因便而清血隨出又有酒

セネクムテ

カ

罌心方卷七

トハ

痔肛邊生創有血出又氣痔大便難而血出肛之  
出外良久不肯入諸痔皆由傷風房室不慎醉飽  
合陰陽致勞擾血氣而經脈流溢滲漏腸間  
衝發下部痔久不瘳變為瘻也 養生方云忍大

便不出久作氣痔 龍門方云一日腫生息肉狀如棗

核孔有膿血名曰雄痔二日孔傍有創內引孔痛

出膿血如虫行名曰雌痔三日孔膿如虫行名曰脉

痔四日大行肛出數寸名曰腸痔五日大行後血令人

少色懶墮不欲食名曰氣痔皆猶食肉欲酒

傷寒飲過多所得也

瘡病禁忌

千金

方云禁寒食猪突生魚菜房內病瘳之後百日

今通房內又云通忌蓴菜蓴菜槎要方云禁

肥肉生魚可食物千金方云得食干白干白宗

葛氏方云作鯖魚鯖魚薑薑薑食之多少任人食

經云搯實搯實鯛鯛魚魚蠶蠶魚魚海鼈海鼈療瘡療瘡

竹筴竹筴本草云羊蹄羊蹄主瘡拾遺云鯽魚鯽魚

主赤白利及五瘡療瘡病經云佛告阿難陀

汝可諦聽此療瘡病經讀之持繫心勿忘



亦於他人廣為宣說此諸痔病悉得除不愈彌所謂

風痔契痔陰痔三合痔面痔腸中痔鼻內痔

齒痔舌痔眼痔耳痔頂痔手足痔背脊痔

糞門痔遍身支節所生諸痔如是痔病受悉

皆乾煖墮落銷滅必是無類皆應習持如是

神咒即說咒曰 恒姪他 阿爛帝 阿蘭逮

室利鞞 室里謎々々磨羯失質三婆

跋都婆訶 小品方五痔齏治酒客及勞損

傷冷下部中有旁孔起居血縱橫出者及有



實者方悉主之 赤小豆四分ヤハラク 蜀黃耆二分ハラク

蜀附子一分フシ 炮ヒツク 夕藥二分ヒツク 白朮一分ヤハラク 黃芩二分ヒツク

桂心一分 七物セブツ 搏末下篩以酒服方寸匕日三服有

驗 又云治穀道瘡痛痔瘡槐皮膏方ヤハラク 槐皮

五兩 練子五十枚アフチ 枳人五十枚 甘草二兩ヤハラク 當歸ヤハラク

赤小豆二合 白朮二兩カモ 七物咬咀以猪膏二分ヤハラク 煎令

白芒黃藥成絞去滓傳之日再三良今案桂要方云療痔如火

燒刀割行坐不可忍下床暑藥上床即痛宜神効 千金方云五痔有氣

痔溫寒濕勞即菽地脫主之ヒツク 牡痔生實如鼠

更衣  
如廁  
ノ

乳在乳在乳中頗見外妨於更衣敝龜甲主之牝痔  
從乳中起外腫五六日自潰出膿血帽皮主之腸  
痔更衣挺出久乃縮牡猪左足懸蹄甲主之脈  
痔更衣出清血蜂房主之藥皆下篩分等  
隨其病倍其主藥為三分且以井花水服半方  
寸匕病甚者且暮服之至可至四五服又云治痔  
下部出膿血有虫旁生孔竅方槐白皮一櫺剉  
內釜中煮令味極出置木甕中適寒溫坐其  
中欲大便狀虫悉出冷又易之又云五痔方漆龍

瞻取老乃心神良一切方皆不及此方又方煮桃

根洗レ僧深方治痔神方 槐耳ヒナノミ為散服方寸

匕ツ粉穀道中甚良錄驗方治痔方 白蜜

塗レ有孔ハナ以內孔中張溫表上使蜀所得也又方

煮槐根洗レ者婆方治人下部シタノミ紫風虛結成痔

久不老令人五下面黃瘦無力方 白錫ハク糖ツツ但少

空腹食老乃心若ハナ是秋月ハナ玆宜 集驗方治痔

方 生槐皮十兩削去上皮一物ハナ熟ハナ擣丸如彈丸綿裹之

內穀道中ハナ槎要方ハナ療痔神方 鯢魚ハナ三頭破腹

取腸炙少許令炙香以綿絮裹之內穀道中

一飯頃虫當出食炙腸更易暑新者盡三枚即

老葛氏方治患腸痔每大便恒去血方常服

補黃方寸匕日三須老心醫內方療五痔下血

不止無問冷熱者方黃者十二分猪後懸蹄十四

枚炙髮カアノヒ灰青布灰アキヌ緋布灰ベニヌ各二分カキモノ棗本五分大

黃十二分クセノ皮猬皮カサノ八分炙露蜂房オホナハシ八分炙蜜九空

腹飲送世丸日二加至知イナ為度甚効救急單驗

方療五痔方五月五日取蒼耳ナモア葉葉陰乾未水



野鷄  
痔病名

服二方寸匕日三又方牛角<sub>本草角中角也</sub>麝燒末和酒服方寸匕

三秘驗 傳信方療野鷄方 右以槐枝湯洗

痔上便已<sub>下</sub>芟灸上七壯以知為度王及充遷安撫

到官乘騾馬入駱谷數日而宿有痔疾其狀如

胡<sub>カニリ</sub>瓜貫於腸契如火到一驛<sub>イリ</sub>臙卧無計有主<sub>カ</sub>郵

者云郎中此病某曾患來須灸即老命所使為

槐湯洗痔上便灸之到三四壯忽覺一道契氣

忒然入腹中目大轉先出血後乃有穢一時出楚

痛瀉後遂失胡瓜所在登騾馬而馳



治九虫方第十六

病源論云九虫者一日伏虫狀長四分二日蛔虫長一

尺三日白虫長一寸四日肉虫狀如爛李五日肺虫狀如

蟬六日胃虫狀如蝦蟇カエル七日弱虫狀如依禰ヨリミ八日赤虫

狀如生肉九日蛭虫至細微形如菜虫此諸虫依

腸胃之間若府藏氣實則不為害ナセ若虛則能

侵食ハム隨其虫之動而變成諸病蓋祖方云九虫丸治百

虫方ウツバナキ子貫衆オニホウヒ 蜀法漆クセキ 益棗ヒキモクワ 雷丸ライワ 檣皮

凡六物分等搗篩蜜丸如大豆將求服卅丸日二令

虫下

又云九虫散

古説及

藿蘆二兩オニホウヒ

貫衆一兩

干漆二兩ウツハナキ

狼牙一兩オニハナキ

凡四物下篩以羊膏アヒモノ蜜汁ハチミツ

服一合日三

治三虫方第十七

病源論云三虫者長虫赤虫蛻虫也猶是九虫

虫之類也長虫蛔虫也長一尺動則吐清水出心

痛貫之則死赤虫狀如生肉動則腸鳴蛻虫

至細微形如葉虫也居徒弄及胴腸間多則為痔

割則為癰因人瘡處以生諸癰疽癰瘰癧

醫心方卷二

二二

七一九

疥癬俱禹又虫無所不為 槩要方治三虫方 取

菜萁カラハミカス東行根大者長一尺麻子八升搗ミナ之細削

菜萁以八升酒合漬一宿布絞しぼ去滓宿勿食且

起盡飲之便下虫ミナ或見出ミナ或半爛或黃汁アル

者是虫爛也タルタル作藥時莫道ミナ之虫不下 葛氏

方治三虫方搗菜絞取汁飲一升

治寸白方第十八

病源論云寸白者九虫内之一虫是也長一寸而

色白形小福目府藏虛弱而能發動或云飲

白酒以桑樹枝貫牛肉炙食并生粟所成又

云食生魚後即飲乳酪令生之 又云此虫長

長一尺則令人死之 葛氏方治寸白方 多食

榧子<sup>カノヲ</sup>之佳 又方煮猪血宿不食明旦飽食之

又云濃煮猪櫛櫛飲三升虫則出盡

又云治蛭虫方用龍膽根<sup>服</sup>多少任意煮

令濃去滓宿不食清朝<sup>服</sup>一二升不過

二又方鵠生芟絞取汁即斗宿不食朝飲

一升常下蛭 集驗方治寸白方取茱萸根洗

去去切一外漬一宿平旦分再服取樹北陰地

根又方桑根白皮切三外以水七外煮取二外

宿無食一頓服之者婆方云狼牙丸治寸白方

狼牙四分ハツバキ蕪夷ヒキセクラ四分白薇ヤチカア四分オニホラヒ芍藥四分

干漆四分右五味鴉篩丸如完豆服十九醫門

方療寸白方橘皮狼牙唐雷丸唐分等末可以湯

服方寸日一虫當盡出錄驗方治寸白方大檳榔

枚オシロイ碎オシロイ葱オシロイ白切一外豉クマ一合凡三物以水五外煮

取二外半頓服昂下今案酢研雄黃付之又方



酢研櫟棉子付之又方研胡桃子付之并食之

又方芥子如上

治蛔虫方胡枳實入腹中長虫也第十九

病源論曰蛔虫者是九虫之內一虫也長一尺五寸有長五六寸或目府藏虛弱而動或目食甘化而動其發動則腹痛發作腫聚行來上下痛有休心心攻心痛口喜吐涎及吐清水貫腸心者則死新錄方治蛔心痛發吐水方取練樹東南下根切不露者一升以水二升煮取一升去滓服

七合十里久更溫餘者服之當利蛔三百枚暑其鍊

取署子者名雌練毒薇元子名雄練毒列或

至致人者諸虫病欲月上旬療之中旬已後虫下

藥不中し 廣洛方云治蛔虫寸白方 取酸石

榴根切二升入去七寸東引者 檳榔十枚 碎切

水七升煮取二升六合絞去滓暑少米煮作稀

糲平晨空腹傾食し少間虫死快利寒

錄驗方治蛔意故湯方 意故根二斤洗細切以

水七升煮得三升先食盡飲之弱老分二服之

一宿蛔蟲爛下人強者盡服之

如清多腹中虫也

治蛲虫方第廿

病源論云蛲虫者猶是九虫內一虫也形甚小  
如今之<sup>之</sup>蛲虫狀目府藏虛弱而致發動甚者則  
能成痔瘻疥癩癰疽諸瘡此是人體虛極  
重者故蛲虫因動作無不為之

握要方云

療長虫赤虫蛲虫寸白方 以薏苡根ハシタ以水七升

煮取二升分二服 今案新錄方 薏苡根二升

范汪方治蛲虫方 練實アヲク淳苦酒中再宿以綿

果衣シ塞穀道中令入二寸日易錄驗方治蛇

虫在穀道中痒或痛方附子干薑又九箇蘆茹又九箇

蜀椒フセハハカ一各一梲蒟綿裹因穀道中不過再傳良

新錄方治病蛇虫或攻心痛如刺口吐清汁方

搗生芰絞取汁宿勿食清朝飲一升當下蛇

又方取練水根剉之以水煮令濃赤黑色又汁

合米煮作强糜カクユ宿勿食清朝食之稍從ト為始

小息復食一匕食半外糜便下蛇秘方

又方薏苡根二斤細剉水七升煮取三升久再服之

可以作糜又

醫心方卷第七



--	--	--	--	--	--	--	--	--

醫心方卷第七札記

一頁上陰莖腫痛仁和寺本  
四行行六穀道瘡方仁和寺本  
瘡下有痛

字下一治陰瘡方第一  
仁和寺本此下有  
虛勞二字細注  
八瘡後

仁和寺本  
作瘡瘡  
二頁上傳瘡上  
延慶本此下有  
方日二三度忌猪肉十二

字注  
方云  
仁和寺本  
五如捲  
延慶本  
行三錦經

仁和寺本  
寺塔記銘亦經作經  
凡塵旁多從厘  
九行或

二雨  
延慶本同仁和寺  
六行蝦蟇  
延慶本墓  
下有失字  
行

勅瘡上  
仁和寺本勅  
四頁上新錄要方  
延慶本  
無要字

行又方杏人又方水煮棘針又方水煮枇杷皮  
仁和寺本  
水煮枇杷皮

醫心方卷第七札記

在上次水煎棘針

五頁上

治陰莖腫痛

仁和寺本無壹字

次告人前後倒置

五行

下六

五陰器

仁和寺本無器字

行陰器

仁和寺本無器字

下六

行

塗之立消

仁和寺本此下有又方燒牛屎末告酒和塗之十一字

行

左腫灸左

延慶本左腫間傍書有核字

七頁上

一行注

或七壯

仁和寺本此三字為

又本

下二

月布衣

仁和寺本無布字

八

又方嚼大麻子傳之

九

又方濃煮香藥洗之

仁和寺本此二方倒置

八頁上

各三

雨

仁和寺本此三字為本文

六行

名五分

仁和寺本此三字為本文

八行注

仁

和寺本

作也

下六

牡丹五等散

延慶本

九頁上

有

水類

仁和寺本無有字

下三

又云類

仁和寺本此作方

上四

行氣喘

仁和尚寺本喘作喘

行下九

施粉

仁和尚寺本施作拖

十一頁下  
五行傍記

人脉刺穴安針判之穴也

仁和尚寺本作脉人刺穴安針之穴也

六行  
注燒

炷烟絕

仁和尚寺本此四字為本支

十二頁  
下三行

又方諸肉

延慶本諸作猪

三十

頁下  
六行

一合

仁和尚寺本合字重

八行

治合

仁和尚寺本合字重

十四頁  
上四行

三

寸

仁和尚寺本三作二

七行治疳濕方

延慶本濕作壘

下一行

燒

仁和尚寺本疼

燒作

五行腸胃

仁和尚寺本作腹胃

十五頁  
上三行

顏赤

仁和尚寺本顏作類

下三行

大

仁和尚寺本大作太不重

四行

苦豈

仁和尚寺本同案豈恐管

十六頁上

如鼠乳

仁和尚寺本此下有出在外者四字

八行

瘡痛

仁和尚寺本此下有而復出五

字  
行下四

痔久

仁和尚寺本痔作疾

十七頁  
上三行

今通

仁和尚寺本今作合延慶本

同

下二

腸中

仁和寺本  
腸作腹

四  
受患

延慶本無  
此二字

十八  
頁上

一赤小豆四分

延慶本  
無焚字

十九  
行槐耳

延慶本  
耳作耳

六  
行

白錫糖

仁和寺本同業  
錫是錫之訛

廿  
式然

延慶本  
式作戎

廿一  
頁上

六  
出心痛

仁和寺本出  
下有則字

七  
貫之

仁和寺本  
之作心

廿二  
頁上

令生之

仁和寺本  
損人精氣腰脚疼弱十二字

七  
一二

仁和  
寺本

作三

下一

漬一宿

延慶本漬下旁書  
有酒一升三字

廿三  
頁上

仁和寺本  
化作肥

七  
腸心

仁和寺本  
腸作傷

下九  
人弱老

延慶本  
無人字

廿四  
上  
行  
盡服之

延慶本此下有一  
方切一升五字

五  
疰諸

仁和寺本  
疰下有痛

字

八  
行

薏苡根

延慶本  
無根字

下八

小息

仁和寺本  
小作少



醫心方卷第八 手足

後五位下行鍼博士魚丹波宿祢康賴撰

脚氣所由第一

脚氣形狀第二

脚氣輕重第三

脚氣姑息法第四

脚氣瘡體第五

脚氣腫痛方第六

脚氣屠弱方第七

脚氣入腹方第八

脚氣脹滿方第九

脚氣轉筋方第十

脚氣冷熱方第十一

脚氣灸法第十二

脚氣禁忌第十三

脚氣禁食第十四

脚氣宜食第十五

治脚腫方第十六

治尸脚方第十七

治肉刺方第十八

治手足凍瘡方第十九

治手足發脹方第二十

治手足皸裂方第二十一

治手足逆腫方第三

治代指方第三

治指刺痛方第三

脚氣所由第一

病源論云凡脚氣病皆由感風毒所致也初得此病多不即覺オホエ或先無他疾而忽得之或曰衆病後得之

蘇敬論云夫脚氣為病本日腎虛多中アツ肥ヲシ溢肌膚腎虛筋之虛者無問男女ナカ若瘦而勞苦肌膚薄實皮腫厚ナカ緊者シモ衆患之無死憂シモ一老已後又患之立冷濕地多飲酒食麵シヤウコ心情憂憤公對又此也使發動晉宋已前名為緩

風古來無脚氣名後人以病從脚起初目腫滿故  
名脚氣耳

唐侍中論云凡脚氣病者蓋由暑濕之氣鬱積  
於內毒厲之風吹薄其外之所致也

徐思恭論云此病多中開樂人忌日久立冷濕地此  
病多或踏墊來即冷水浸脚或房室過度卧不震

脚或心情憂苦居墊差地此皆實脚氣之證也

又云清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起

於上又身半已上者風中之身半已下者濕中

之此蓋風濕之病也

千金方云凡四時之中皆不得久立坐濕冷之地  
不得因酒醉汗衣脫衣靴帽當風取涼皆成  
脚氣

又云夫風毒之氣皆起於地之寒暑風濕皆  
作氣氣是常履之所以風毒之中人也必先中  
脚也久而不愈遍及四肢腹背頭項也

據要方云此病有數種有飲氣下流以成脚氣  
飲氣即水氣之衝亦有腎氣先虛暑月乘以

冷水洗肺濕氣不散

亦有腎氣既虛諸事不節セ日居卑濕氣上

衝亦成肺氣

脚氣形狀第二

病源論云凡脚氣此病之初甚微飲食嬉戲

氣力如故流白也當ハシ就ハシ索之其狀自膝至脚有不仁或

苦痺或淫流白也如虫行所緣或脚指及膝胫酒赤也

小脚或居弱不能行或微腫或皓冷或疼

痛或緩縱不隨或有痺急或有至困能飲食

痺至文  
脚氣至文  
病也至文  
流也至文



者或有不能食者或見飲食而嘔吐惡聞食

臭者或有物如指發於胸腹逆上撞心氣

上者或有舉身轉筋者或壯熱頭痛者或心

胃衝博腹中腹裏不欲見明者或腹內苦痛而兼下

者或語言錯亂喜忘誤者或眼濁精神昏憤

者此皆病證也

唐臨論云此病形惟大同小異或脾冷疼痺

或行急房弱忽或兩胫腫滿或脾漸枯細或心中

憤憤直龍反或少腹不仁或舉體轉筋或見食臨送

或胃滿氣急ナリ或偏身酸痛素官也皆肺氣僂也レリナリ

蘓敬論云肺氣復發或似石發病也惡寒壯熱病也頭

痛辛足運冷モト或似瘧發病也作有時又似傷

寒脉甚滯急ナリ七日已後壯熱既定脚氣狀見也

徐思恭論云此病甚微飲食嬉戲語笑氣力

如故率不令人覺ナカニ當熟オホエ之察其狀自膝至

膝其間有若佐元不仁之處痛痺名也或脚指及膝胫不主自邑

々オチ或起行アリク脚無故屈弱不能行或微腫不主自皓

冷而消疼或緩縱不隨或患羣急或偏有冷處ナリ

此皆肺氣之微シルシナリ

又未初得之時即或肺フ跌腫ふ或脚腫漸々向上

或由來モトヨリ不腫唯緩弱頑痺行卒ニハカニ屈倒ハ毒氣陰

上攻心フホテ皆死此則形證不同皆名肺氣不腫冷

多腫則熱トキハ熱毒矣

小品方云風毒中人ル多不即覺或目衆病乃覺也

其狀或有見食乱也噉憎聞食臭或有腹內痛魚

下或胃中衝悸ルシト有不欲見光明或精神惛憤或喜コラム

妄語錯乱或其至熱頭痛或身酷冷脗疼或喜舉

轉筋或兩脚被腫ハル或直痺ハル或膝至脚不仁  
時緩縱不隨此皆脚病之證也

千金方云風毒之中人也ヤフル或見食嘔吐憎聞食臭

或有腹痛下利リハル或大小便秘セ不通或胃中

衝悸不欲見光明或精神昏憤或喜迷妄語妄言

諸言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷疼煩或覺

轉筋或脚不腫ハル或脰脚頑痺痺不仁或時緩縱

不隨或復百體羣急口鼻支或小腹不仁此皆脚氣狀

貌也又云其人本黑瘦者ヤル易治本肥大亮



厚赤白者難愈

痿要方云肺氣皆令人肺腫大腫跂腫重悶甚

者上衝心腫滿悶氣短中間有乾濕者二肺氣

濕者肺腫乾者不腫漸覺枯燥皮膚甲錯頑

細索之

肺氣輕重第三

蘇敬論云凡肺氣病多以春末夏初發動春發

如輕夏重入秋少輕至冬自歇大略如此亦時有

異於此候者又云凡肺氣脈有三種以緩脈



為輕沉緊為次洪數為下沉緊者多死洪數者

並生緩者不治自老

又云又有不腫而緩

騎行卒厥倒漸至不仁毒氣陰上攻心便死急

不旋踵竟死歲月耳

唐臨論云此病脇滿氣上便教人急者不全日緩

者或一二月初得此病便宜速治之不同常病也

徐思恭論云凡脚氣皆有陰陽若兩膝及髀

已來腫滿柔之應骨々疼又痛者此名陰陽

脚氣陰陽俱患不宜攻心々則死者十有七

八若兩脚唯緩弱行起不得不腫案之應骨  
之疼之痛者此名陰脚氣陰上則死者十有四  
五若直皮膚上腫不癢行步之不疼痛者此  
名陽脚氣縱上至面及手指三無死憂

千金方云小覺病惟有異即須瀉大怖畏決  
意治之緩氣上入腹或腫或不腫胃胃連  
滿氣上肩息急者死不延踵寬者數日必死  
不可不急治也但緩心急氣喘不停或白汗數  
出或乍寒乍熱其脉促短而數臨吐不心者皆

死相也

小品方云脉浮大者病在表沉細者病在裏其

脉深大緊駛者三品之中最惡脉也

葛氏方云脉弱滿而痺至少腹而小便不利氣

上者死

肺氣姑息法第四

唐臨論云姑息肺氣法依此消息必得氣愈第

一忌噓イカルハ即心腹煩ハ即肺氣發動第二忌大

語トキハ即損肝肺ハ損之發動又不得露脚當

要言云云

礼記檀弓云  
嗔  
十年

風入水以冷水洗脚、胫尤不宜冷暑雖暑月常恒

須著綿襦至冬寒倍令兩脚胫溫暖有汗是

大佳之法依此將息氣漸得薄損每至日寅日割

手足甲丑日午甲寅日是甲子宜十二日一度割、少

侵屏太去氣又數須用梳櫛頭每梳發欲得一百

餘梳太去氣每且長展脚坐午攀脚七度令午

著脚指漸至時心極踏午用力極舉脚每日如此

脚氣之不傷人若頭面及項少似契氣上即露

背膊取冷使腰脊冷其背膊令極冷然後著

厚字  
作解



衣必須如此姑息シヨク必漸老若不姑息セ立見危タチトシタニ殆固シ  
篤轉ムク加易發動便致性令雪洗面及脚皆須  
熱湯キ小添ハシ冷水洗之

蘇敬論云凡脚氣病人不能永老カクニ要至春夏還  
復發動復時膝理用不宜卧睡シ覺令入樓梯モ勿  
使耶氣セ留セ數勞動カクニ開開常令通暢暢此並  
養生之要提拒セク風耶法也尋常ヨリ有身力每食後  
行五六十步覺オ皆有汗下被出力少疲倦セ便心如此心  
脚中惡氣隨即下散雖加浮腫氣不能上上也



肺氣療體第五

徐思恭論云肺氣之病療乃百途（ル）故須（ル）原始要終案具形證作穴針灸當病用藥如得（モ）其由略無不（イ）老（エ）

又云肺氣之病不同餘病一患已後難（ヤ）老（ル）易（シ）發（ル）訖（ル）惟不同訖（シ）病進藥隨其冷熱旬月有變（ル）補（ル）寫（ル）觀其虛實皆臨時之宜（モ）不可（モ）純（ル）依古方也

竊敬論云夫療肺氣者須（ル）順（ル）四時春秋二時（ル）宜（ル）無（ル）補（ル）寫（ル）夏則疾盛專須（ル）汗（ル）利（ル）或十月以後乃用（ル）補（ル）

藥雖小ハルコト變通終不越此法有孔又曾カサチ以夏時

見患汗利得シテ老冬時遇病還令汗利或冬見

用補藥得除至夏時遭患遂令用補此並下愚

專固ハナハ之同穿鑿者也雖懷渚物之心既未深達セ

之何異以治葛救飢人字又云今略述病有數

種形證不同每發シナ老異為療品殊前用經効後

用便增劇ナリ一旬之內變僅不等ヒトシ不可以先方救後發

也又云且脚氣為病不同餘病風毒不退ハレ未

宜停藥ハ比見ア病者皆以輕疾致斃或因病小瘳則

言疾愈癥藥不服或已服藥而患未退謂藥病

相違乃改為他療皆自取危殆

又云凡肺氣病雖苦虛羸要不可補藥唯宜冬

月酒中用之丸散不可用補服必臃脹非篤不

差庸醫多不曉如此謂為腎虛多將補藥有不終

割而斃也若以療肺氣法用療風病則十愈九

矣如當病用藥終元不差肺氣非死病若不肯療

自取死耳非病能教人也

又云夫有肺氣病不可常服補藥多令鼓脹累

服藥多令鼓脹累

實則難救也。每月之中，須三五行利，為佳。縱常

服藥時，取利之宜時，取汗當微冷，熱消息不

可專一法也。覺熱煩口乾，頭面熱，悶即須取冷

覺頑痺不仁，身體強屈，冷疼者，便煖將息。此並

可解尋常飲酒作蕊，致酒服之大，避風濕，兼利

腰膝

又云：冷毒盛，脹即服金牙契毒。盛脹須服紫雪

平<sup>ハラクレハ</sup>脹者，單用<sup>ヒトヘニ</sup>頓椅飲<sup>ヨ</sup>之，善患肺氣人，或遠行

或在家，恒須有金牙紫雪

藥也一名金牙出俱馬王野國



又云諸毒氣所攻セム、内則心急悶フ不療至死若攻

外毒出シ皮膚ハ則不レ仁ナリナラハ者膏糜スレハ之若未

出皮膚在營衛五氣也刺痛者随痛處急宜灸之三五

炷ラ主即老不必要在孔穴也カタクハシモ遠方無藥物處急宜灸

之衆明堂無ナクモ正穴但随所若火フ艾徹ハル處痛便消散

醫門方云夫療脚氣或兼諸病者則依證以當トモ

藥對ハル之若乳石動發則以理石藥療之若大小便

秘セシハ澀則以利ハル大小便藥療之若皮膚虛腫成水ナラ

病者以水藥療之餘皆放此又云脚氣毒盛非ハ契



藥不解如<sup>イモシ</sup>契甚毒發<sup>イモシ</sup>松<sup>イモシ</sup>條<sup>イモシ</sup>頭<sup>イモシ</sup>面<sup>イモシ</sup>契<sup>イモシ</sup>悶<sup>イモシ</sup>者<sup>イモシ</sup>荊<sup>イモシ</sup>根<sup>イモシ</sup>汁<sup>イモシ</sup>

或竹<sup>イモシ</sup>應<sup>イモシ</sup>夜<sup>イモシ</sup>卧<sup>イモシ</sup>服<sup>イモシ</sup>之<sup>イモシ</sup>不<sup>イモシ</sup>過<sup>イモシ</sup>數<sup>イモシ</sup>日<sup>イモシ</sup>風<sup>イモシ</sup>契<sup>イモシ</sup>並<sup>イモシ</sup>老<sup>イモシ</sup>

脚<sup>イモシ</sup>氣<sup>イモシ</sup>腫<sup>イモシ</sup>痛<sup>イモシ</sup>方<sup>イモシ</sup>第<sup>イモシ</sup>六<sup>イモシ</sup>

徐<sup>イモシ</sup>豉<sup>イモシ</sup>酒<sup>イモシ</sup>方<sup>イモシ</sup>若<sup>イモシ</sup>能<sup>イモシ</sup>常<sup>イモシ</sup>飲<sup>イモシ</sup>此<sup>イモシ</sup>酒<sup>イモシ</sup>極<sup>イモシ</sup>利<sup>イモシ</sup>腰<sup>イモシ</sup>脚<sup>イモシ</sup>嶺<sup>イモシ</sup>南<sup>イモシ</sup>常<sup>イモシ</sup>服<sup>イモシ</sup>

此<sup>イモシ</sup>酒<sup>イモシ</sup>必<sup>イモシ</sup>佳<sup>イモシ</sup>及<sup>イモシ</sup>卑<sup>イモシ</sup>溫<sup>イモシ</sup>靈<sup>イモシ</sup>忍<sup>イモシ</sup>服<sup>イモシ</sup>亦<sup>イモシ</sup>好<sup>イモシ</sup>又<sup>イモシ</sup>恐<sup>イモシ</sup>有<sup>イモシ</sup>脚<sup>イモシ</sup>氣<sup>イモシ</sup>即<sup>イモシ</sup>

宜<sup>イモシ</sup>服<sup>イモシ</sup>之<sup>イモシ</sup>

好<sup>イモシ</sup>豉<sup>イモシ</sup>三<sup>イモシ</sup>升<sup>イモシ</sup>以<sup>イモシ</sup>美<sup>イモシ</sup>酒<sup>イモシ</sup>一<sup>イモシ</sup>斗<sup>イモシ</sup>漬<sup>イモシ</sup>先<sup>イモシ</sup>取<sup>イモシ</sup>豉<sup>イモシ</sup>三<sup>イモシ</sup>莖<sup>イモシ</sup>三<sup>イモシ</sup>曝<sup>イモシ</sup>乾<sup>イモシ</sup>

內<sup>イモシ</sup>酒<sup>イモシ</sup>中<sup>イモシ</sup>漬<sup>イモシ</sup>三<sup>イモシ</sup>宿<sup>イモシ</sup>便<sup>イモシ</sup>可<sup>イモシ</sup>飲<sup>イモシ</sup>隨<sup>イモシ</sup>人<sup>イモシ</sup>多<sup>イモシ</sup>少<sup>イモシ</sup>用<sup>イモシ</sup>澤<sup>イモシ</sup>傳<sup>イモシ</sup>脚<sup>イモシ</sup>良<sup>イモシ</sup>

葛<sup>イモシ</sup>氏<sup>イモシ</sup>方<sup>イモシ</sup>  
同<sup>イモシ</sup>之<sup>イモシ</sup>

蘓療脚氣初發從起至膝腫骨疼者方

草麻切搗一斗許右並契鋪脚腫處厚累日三

度易二三日即消聲門方同之

又方秋月已有草麻冬月則無宜取蒲藿

根切搗碎酒糟和蒸令契三分根一氣糟合蒸

令契鋪累如前法二日即消立効療頑痺不仁

者千金方同之

唐方以酒糟一斗和塩氣作二分炒令契將故祿乳

累鋪之冷便易以腫消為度

キ一者今思一藥也

唐療肺氣<sup>アレン</sup>牽<sup>キム</sup>不能行及乾<sup>カキ</sup>疼<sup>ヒライ</sup>不腫自漸<sup>カシ</sup>枯消或復腫滿

緩<sup>ナ</sup>弱<sup>ナ</sup>方

取桃<sup>カキ</sup>柳<sup>カキ</sup>槐<sup>カキ</sup>桑<sup>カキ</sup>穀<sup>カキ</sup>五木枝葉各切一斗以水一斛塩五  
升煮取五斗浸<sup>ヒシ</sup>持<sup>ヒシ</sup>膝<sup>ヒシ</sup>以<sup>ヒシ</sup>下一持得七日老<sup>ヒシ</sup>菰<sup>ヒシ</sup>即浸<sup>ヒシ</sup>持<sup>ヒシ</sup>  
亦良

唐浸脚腫滿及緩<sup>ナ</sup>弱<sup>ナ</sup>不仁疼<sup>ヒシ</sup>痺<sup>ヒシ</sup>等方

柳樹白皮<sup>ユカニ</sup>細<sup>ヒシ</sup>坐<sup>ヒシ</sup>如<sup>ヒシ</sup>碁<sup>ヒシ</sup>子<sup>ヒシ</sup>三大升<sup>ヒシ</sup>以水一大石煎取

六斗取一小<sup>モタ</sup>甕<sup>ナ</sup>可<sup>ヒシ</sup>受<sup>ヒシ</sup>一石者內湯甕中以<sup>ヒシ</sup>兩木<sup>ヒシ</sup>橫<sup>ヒシ</sup>

橫<sup>ヒシ</sup>甕底<sup>ヒシ</sup>脚踏<sup>ヒシ</sup>其木上湯不得過三里<sup>ヒシ</sup>穴一日

一度易<sup>カフ</sup>不過<sup>ル</sup>三度即消<sup>モシ</sup>如浸<sup>ヒタシ</sup>時恒<sup>シタツ</sup>使湯<sup>アツカラ</sup>契佳<sup>シ</sup>

唐又方如大腫不能行動者方

取松木<sup>ルキ</sup>剉<sup>ツイ</sup>三石赤小豆二斗以水六石煮取<sup>シ</sup>石七斗

取小瓮子依前折樹皮浸<sup>ル</sup>法若患<sup>ル</sup>繁煩不能久<sup>シ</sup>

浸者紫蘂<sup>イヌエナノヲ</sup>押<sup>オセ</sup>之即定之其湯不須易之以糠火溫<sup>アタタメ</sup>

——似苳菜也又本草在一名蘂也

用

唐又方如脚氣悶者方

以水煮<sup>アツク</sup>梓<sup>アツク</sup>枝葉<sup>イハキ</sup>為湯添<sup>ツク</sup>冷水<sup>ヒヤク</sup>塩<sup>シホ</sup>等<sup>ヒタシ</sup>和漬<sup>ヒタシ</sup>脚氣散<sup>ヒタシ</sup>少<sup>シ</sup>

使使<sup>ヒタシ</sup>脚<sup>ヒタシ</sup>逆<sup>ヒタシ</sup>不悶大驗

徐療氣腫方

赤小豆一大升 石生研ナシム大麻子汁煮前件小豆令爛ワセ  
每服令盡此升甚療腫不限服數多少以消為度ナシ

唐熏脚氣法ナシ

石以籠兩具以石灰摩搗ヌリ淫褸ヌリ安二寸灰上著オケ炭ナシ  
火之上著二寸灰上著好塩从脚踏上

蘘療大腫不能行動者方ナシ

以水煮枚木作湯漬ヒタシ將大神ナシ



又方搗烏麻<sup>カキ</sup>砵水<sup>カキ</sup>煮漬<sup>カキ</sup>疔<sup>カキ</sup>肺<sup>カキ</sup>大驗

唐療手足腫滿<sup>カキ</sup>洪直者<sup>カキ</sup>大豆<sup>カキ</sup>煎方

大豆二升<sup>カキ</sup>淨擇<sup>カキ</sup>穀樹皮<sup>カキ</sup>一握<sup>カキ</sup>橘皮<sup>カキ</sup>三兩<sup>カキ</sup>桑根<sup>カキ</sup>白皮

二握<sup>カキ</sup>紫蘘<sup>カキ</sup>莖<sup>カキ</sup>一握<sup>カキ</sup>先以水<sup>カキ</sup>四斗<sup>カキ</sup>煮大豆<sup>カキ</sup>取二斗<sup>カキ</sup>汁

去滓<sup>カキ</sup>待清<sup>カキ</sup>別以清<sup>カキ</sup>酒<sup>カキ</sup>七升<sup>カキ</sup>共豆<sup>カキ</sup>汁<sup>カキ</sup>合煮<sup>カキ</sup>剪<sup>カキ</sup>件<sup>カキ</sup>藥<sup>カキ</sup>取

七升<sup>カキ</sup>分為三服<sup>カキ</sup>如氣力強者<sup>カキ</sup>日別兩<sup>カキ</sup>三服<sup>カキ</sup>力弱者<sup>カキ</sup>日服

逐驗腫消<sup>カキ</sup>後忌食<sup>カキ</sup>大酢

唐療氣腫上至腰<sup>カキ</sup>小便澁<sup>カキ</sup>諸藥不効<sup>カキ</sup>宜服方

亭<sup>カキ</sup>厯子<sup>カキ</sup>二兩<sup>カキ</sup>砵<sup>カキ</sup>大棗<sup>カキ</sup>十四枚<sup>カキ</sup>去核<sup>カキ</sup>

石以水三升煮取二升分三服

經心方治脚腫滿步行不能衆惡毒水腫牽牛子丸方

方大黃二兩朴消三兩練牽牛子七兩葵排人二兩七示

干薑二兩半人參二兩カニヤク橘皮一兩半

石七物鳩下節以蜜和杵春万杵服如梧子廿九カニヤク

微利為度愈腫即止不著盡劑者万毒万カニヤク

病廿八種風邪悉愈用甚驗禁冷水猪苓等

謹要方療脚氣遍身腫方

大豆三升以水二斗煮取桑根白皮一握切櫛櫚三

七顆セツカク 摩マ

伏苓フツゼイ 二兩ニリョウ

右以前豆汁浸經一宿フツゼイ 煮取二升ニシヨウ 去滓シヅメ 添酒ソノリ 二

合內藥中イシ 随多少服之セハ 利ル 多量減服ハツ

葛氏方云若腫已滿セハ 捻之ニ 沒指者方シ

酒モシ 若水煮大豆飲汁又恒食小豆ヲ

又云若步行ル 足痛不能シ 復動方

煮大豆ムシ 兩リョウ 囊盛フツ 更燂アツテ 以熨之ニ

本草云鯉魚生煮食之主ル 水腫脚滿ニ

陶景本草注療脚氣滿急脹牽牛子得小便

利无不<sup>リ</sup>差<sup>ハ</sup>崔<sup>ク</sup>病<sup>ハ</sup>錫<sup>ハ</sup>食<sup>ハ</sup>經<sup>ハ</sup>治<sup>ハ</sup>肺<sup>ハ</sup>腫<sup>ハ</sup>方<sup>ハ</sup> 煮<sup>ア</sup>蔓<sup>シ</sup>菁<sup>ハ</sup>根<sup>ハ</sup>

差<sup>ハ</sup>傳<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>即<sup>ハ</sup>消<sup>ハ</sup>

又<sup>ハ</sup>方<sup>ハ</sup>煮<sup>ハ</sup>茄<sup>ハ</sup>苗<sup>ハ</sup>葉<sup>ハ</sup>溲<sup>ハ</sup>肺<sup>ハ</sup>尤<sup>ハ</sup>驗<sup>ハ</sup>

肺<sup>ハ</sup>氣<sup>ハ</sup>屈<sup>ハ</sup>弱<sup>ハ</sup>方<sup>ハ</sup>第<sup>ハ</sup>七<sup>ハ</sup>

唐<sup>ハ</sup>云<sup>ハ</sup>若<sup>ハ</sup>肺<sup>ハ</sup>氣<sup>ハ</sup>屈<sup>ハ</sup>弱<sup>ハ</sup>或<sup>ハ</sup>不<sup>ハ</sup>能<sup>ハ</sup>語<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>宜<sup>ハ</sup>服<sup>ハ</sup>此<sup>ハ</sup>金<sup>ハ</sup>牙<sup>ハ</sup>酒<sup>ハ</sup>此<sup>ハ</sup>酒<sup>ハ</sup>最<sup>ハ</sup>為<sup>ハ</sup>肺<sup>ハ</sup>氣<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>要<sup>ハ</sup>

金<sup>ハ</sup>牙<sup>ハ</sup> 碎<sup>ハ</sup>綿<sup>ハ</sup>裹<sup>ハ</sup> 細<sup>ハ</sup>辛<sup>ハ</sup> 苜<sup>ハ</sup>草<sup>ハ</sup>冬<sup>ハ</sup> 干<sup>ハ</sup>地<sup>ハ</sup>黃<sup>ハ</sup> 干<sup>ハ</sup>薑<sup>ハ</sup> 防<sup>ハ</sup>風<sup>ハ</sup>

附<sup>ハ</sup>子<sup>ハ</sup> 炮<sup>ハ</sup> 地<sup>ハ</sup>床<sup>ハ</sup>子<sup>ハ</sup> 蒲<sup>ハ</sup>藿<sup>ハ</sup> 外<sup>ハ</sup>麻<sup>ハ</sup> 各<sup>ハ</sup>蜀<sup>ハ</sup> 人<sup>ハ</sup>參<sup>ハ</sup> 三<sup>ハ</sup>兩<sup>ハ</sup> 獨<sup>ハ</sup>活<sup>ハ</sup>行<sup>ハ</sup>

牛<sup>ハ</sup>膝<sup>ハ</sup> 石<sup>ハ</sup>斛<sup>ハ</sup> 各<sup>ハ</sup>五<sup>ハ</sup>兩<sup>ハ</sup>

石十四味以酒四斗漬之七日飲二三合ヤヤク稍加之以

知ナニ為度此酒最為脚氣之要忌如藥法

蘗白楊樹皮漬酒療脚氣腫心胷滿悶手足緩弱

不能起止方

白楊樹白皮切一大升イナ煮カキ酒カキ袋盛ル

石以酒一斗五升漬三日宿溫服三四合カ如日二三

服至八合タタスモハ能者加之不能者減之無忌若得干

者一升以酒一斗七升之服之皆大効

千金方八風散治風虛面青黑玄色シヤ日月光不見エ膝



肺氣痺弱方

唐一一名肉松

蜚容八分

オハ 樹皮名

烏頭二分

鍾乳四分

イシノキ

暑預四分

オニツヤカラ

續斷四分

黃耆四分

キ

麥門冬四分

ヤブハル

五味二分

セネカワ

澤瀉四分

ナブ井

遠志皮四分

唐

菟絲子四分

エタシクセ

細辛四分

ミナソノネ

龍膽四分

エヤニクセ

秦膠四分

オモタカ

石葦四分

イハシ

栢子入四分

ヒシア

牛膝四分

井ノクハチ

昌蒲四分

ハヒト

杜仲四分

伏苓四分

附子五分

甘草五分

石解六分

イハクハネ

天雄六分

附子名同 橡葛

干地黄四分

地膚四分

ヒルムシロ

山茱萸四分

イタチハミカ

防風四分

ハチハツナ

木四分

カネヲ

干薑四分

卑解四分

オホトコロ

人參五分

カフニケクセ

菊花十三分

世三味下篩

フルア

服方寸匕日三不知加至二匕

ヒ

ル

葛氏方治肺氣疼痺。屈弱不仁。時冷時熱。丸方

先取好豉一升三蒸三曝。干以好酒三升漬之三宿。便可飲。隨人多少。以滓薄。肺其熱得小退也。

又方以酒煮豉服之。

本草云。材皮。煎之以鯉病上。羖心。至冷痺肺氣

肺氣入腹方第八

藕方水研紫雪服之。三下。今案紫雪方堅真云。若肺氣衝心。取山加兩和水飲之。又可服紅雪五六兩。又可桑葉煎良。

唐氣上急悶欲絕者。服生薑汁方。

石生母薑合皮。搗取二升許。汁平旦溫頓服之。三卷。

廣利方治卒肺氣衝心煩悶イ亂不識人方

取ニ取大豆一大升ツツケル拭去其ヲ以水三大升濃煮取汁頓服半升ヤ不定良久更服半升即定

蘘徐木依湯若毒氣攻心手足脉皆絕此三難治不得已作此湯療ル十四五愈方

吳茱萸イタチハヒカフ六升カラハヒカミ木依二顆

石以水一斗二升煮取三升去滓分三服相去十五里

許或利或汗便活イク曾苔毒氣殆死トモ仍此方服得オホ

差此藥甚足起死シ又方无茱萸木依處可取茱萸葉一把握服之

蘓治氣入人腹攻心諸脉並絕不識人面眼牛尿方

烏特沙尿一大升

右取新尿溫者服令盡即得利回便眼明識人

雖不能大<sup>太</sup>療氣然一時救死餘無加也

徐治腫從臍始轉上入腹則斂人猪肝散方

生猪肝一具

<sup>細切</sup>

右以淡蒜<sup>ルハ</sup>蘆<sup>ルハ</sup>食令盡大肝不盡分<sup>セヨ</sup>鱠二服即消

又方以<sup>水</sup>煮單食之

又方蘓云猪壳細切作鱠<sup>イ</sup>轉蒜蘆食日三數日

辟氣毒上風除能行

唐犀角湯療腫已消猶遍身頑痺痺也毒氣已入衝心

悶吐逆不下食或腫未消仍有此候者先服此方大驗

犀角二兩 大棗七枚碎 香豉一升綿裹 紫蘘莖一握

生薑二兩

石以水八升煮取二升八合分三服相去十里頻服三

劑以氣下為度

唐若氣攻心此方甚散氣極驗

大槓榔七枚 生薑二兩 橘皮 吳茱萸カラハカミ 紫蘘



木蓂トヤニ各一兩

右以水三升煮取一升三合久再服

槌要方療脚氣攻心悶腹脹氣急欲死方

吳茱萸三升木蓂切三合アタメ檳榔コロヨク廿顆ル碎ツミシメ竹葉切ツミシメ三升ツミシメ

水一斗二升煮取三升久溫三服得快痢即老慎生

菜契ツミシメ麵高ツミシメ麥蒜ツミシメ

脚氣脹滿方第九

蘓徐療身體浮腫心下脹滿短氣小便澀トナリ害飲食方

大豆一斗以水三斗煮取一斗七升去豆內清湄一斗和

煎之令得一斗七升許調適寒溫一服一升日三服甚佳

今案耆婆方大豆三升ハ擘一升水無升數

茯苓根湯主通身體滿小便澀上氣心下澹水不能食文三

、則脹滿者方

赤根カ白皮五升大豆五升石以水三斗煮取一升三去滓カ三

服之

茯苓徐療腫已入腫腹カ至腹脹小便澀少者方カ

大麻子一斗葵細研赤小豆五升

石以水三斗煮豆爛飲汁食豆日三不食餘食毫

更為之カ

。又方穀樹白皮切一大斗赤根白皮切一大斗入玄深者

石以水五大斗煮取三大斗去滓內大豆二升小豆二升

紫蘗荳葉切一大升綿裹生薑切五兩煮取

爛上渴飲汁飢食豆即小便利腫消又能療面

目浮腫救急

徐唐亭歷九療小便澀少腹滿不下食飲方

亭歷子五兩

後大熬令紫色

杏仁二兩半

去皮尖熬令紫色

大棗廿枚

去皮挽

先搗亭歷子一万杵別取杏仁棗肉和搗一千

杵然後取亭歷子惣和搗一万杵和為丸平旦空腹

服八九丸晚間服五丸二日後小便當利三四日後平

旦服五丸晚間服五丸ル如梧子キリヲ以白飲コッ送ツ禁食ツラキ臍臍ツラキ

之物

臍臍者也

端目欲安治方

治脚氣冷契方第十

唐治脚氣熱煩口乾頭面熱悶方ル

好香豉一升以水四升煮取二升停冷去滓頓服薄立  
謹要方

蘘治若覺食氣攻喉方冷

當食生茱萸五十粒即散丸合方

徐療冷氣非冷契之兼治方

大蒜一升オウソ去皮心オウソ以酒三升ス緩火煎汁一升ス許去滓每服

一盞オウソ子日三大オウソ去氣オウソ但多服オウソ即覺眼中爛オウソ生瘳オウソ

唐云已覺著肺氣宜服此方

蒜三升オウソ去心切オウソ豉一大升オウソ桃人小一升オウソ

右三味合オウソ和生消袋盛以酒一斗オウソ漬之オウソ夏三日冬

日初服半升オウソ漸加至二升オウソ量增減オウソ若盡オウソ更著オウソ五升

酒漬飲之オウソ加枳オウソ一二合オウソ好

肺氣轉オウソ筋オウソ方第十一

論云凡肺氣初轉オウソ筋者オウソ灸萊オウソ筋オウソ萊山二穴



龍門方療胛轉筋及入腹方

取木依子根莖煮湯服並驗

又云療轉胛筋及入腹方

手物カヘ隨所患胛大拇オホサシ指多當胛心急ハヤ筋上ハナテ七炷

又云筋已入腹者令患人伏地以繩絆兩脚ツヅ跌上ヒラ踝下ハカ

兩脚中間ミナ以繩繫柱去地タチ稍高タカ患者身去柱可ハカリ五尺ハカリ即

已捧逆折繩令ナ制ナ患者ナ驗

華他方治轉筋方

以白戴昨并及米汁也煮粉令一沸目以洗足注至足立愈注小品方同

之玉酢并及米汁也

脚氣灸法第十二

蘓唐云凡脚氣發有陰陽表裏當隨狀療之不可  
要依古方也患陽療陰病表救裏皆為重虛重實  
危殆甚也若病從陰發起兩足大指側向上迎胫內及  
股裏煩痺不仁或腫先發於此者皆須隨病灸療須  
灸復留中都陰陵泉曲泉等諸穴灸先從上始カミ向下  
引其氣使下各灸廿壯ユメ自後障白灸七壯取老壯餘穴  
皆依此若病從陽發起兩足小指傍外側カミ向上迎胫外從

絕骨<sup>宛名</sup>至風市頑痺不仁或腫起於此者須灸陽輔絕骨  
陽陵泉風市等諸穴灸數及從上向下皆依前法若  
氣毒兼行表裏者乃可量其輕重隨灸膏摩之<sup>元</sup>  
若上下遍發不知的<sup>アタラシ</sup>處者宜灸上廬下廬<sup>アタラシ</sup>惟口三里各  
灸一二亂以通洩之其用藥內攻各量病投藥也逐偏<sup>ヒトコナク</sup>  
苦憂恒使灸瘡不<sup>シメヨ</sup>老為佳風氣都除乃隨瘡老<sup>アハ</sup>  
後癰色赤者風毒盡青黑者猶有毒氣仍灸勿止待身<sup>チ</sup>  
體<sup>タリ</sup>輕利然後可休矣又一本云常須灸三里絕骨勿令<sup>ナカ</sup>  
瘡老佳

陽陵泉二穴 在膝外側骨下宛陷中是ナカクハナシ 有ナシ 蕪徐

施骨二穴 在外踝上尋小骨頭施陷中是 同前

風市二穴 平立垂手當中指頭脰中兩筋是間 同前

崑崙二穴 在外踝後跟骨上陷中是 同前

陽輔二穴 在施骨前半寸少下是クタル 蕪徐云明堂無施骨名有陽輔

上廬二穴 在三里下三寸是 蕪徐

下廬二穴 在絛口下一寸是 蕪徐

絛口二穴 在上廬下二寸是 蕪徐

犬衝二穴 在足大指本節後二寸是或云一寸半 徐

犢鼻二穴 在膝蓋上外角，宛々中是 蘓徐

腓目二穴 在膝蓋下雨邊宛々是 中徐

三里二穴 在膝蓋骨頭側下骨外三寸下宛々

曲泉二穴 在膝內屈文頭是

陰陵泉二穴 在中腓腓內側骨下宛々中是 蘓徐

中都二穴 在陰陵泉三交中間是 蘓

三交二穴 在內踝上三寸是 蘓徐云名大隙

復留二穴 在內踝上二寸是 蘓徐云名兼令

少陽二穴 在內踝後可動筋中是 徐



三陽二穴

在內踝上八寸骨下陷中是 徠

陰陽二穴

在內踝下向前宛々中是 徠

委中二穴

在腠後屈中央是 獲徠

臑筋二穴

在臑當中心滿中是 獲徠

臑山二穴

在臑脇下際分內間陷中是 獲徠

踴泉二穴

在臑心是 獲徠

石件穴並要カナクヒキ不惣能矣其最要有三里絕骨

臑筋大衝崑崙踴泉患者不可不灸

凡患臑氣法皆春發夏甚秋輕冬歇ヤム大法春秋九ナリ

宜灸冬老可行夏都不可夏既瘡敗又不得著  
衣風冷日久イヘ及更增病冬時血溢ヒナリ又暈ヒカフ天理急不  
得已无藥物處可灸一二穴不可遍體多灸也

凡脚氣病大論毒從下上云ハ從上ナリ向下者或云灸上ハツル  
毒便止云ハ誤矣ナリ比見毒氣攻亂疼痛如刺隨病  
即灸火徹便瘳不物上下カハラ

凡所衝如賊欲出得穴即出豈在大門也風氣所攻  
三復如是皆此經試万不失一云ハ必不為セカフ忤耳セカフ  
七九

葛氏方云其灸法孔穴亦甚多恐人不能悉知處

中平疏字元  
醫書幸有

一經目八十一卷

二十四

七八〇

今止疏要者必先從上始若直灸脚氣上不泄則

危矣

大推一穴灸百壯肩井二穴各灸百壯臑中一穴灸五十壯

一穴灸百壯凡灸此上部五穴亦足以泄其氣若能灸

百會風府胃管及五藏俞亦佳視病之寬急

耳

次風市二穴灸百壯三里二穴灸二百壯上廉二穴灸百壯下廉

二穴灸百壯絕骨二穴灸二百壯

凡此下部十穴並至要猶餘伏菟犢鼻耳

凡發此壯數不必煩畢三日中報之令竟

千金方云凡病一腳則灸一腳兩脚便灸兩脚也  
又云初得脚弱便速灸之弄服竹瀝湯灸訖可  
服八風散無不老者唯速治之若久但灸而不服散  
而不灸如此者有半羸半死雖得老者或至一  
二年復更發動覺得便依此治速灸之服散  
者治十愈竹瀝湯八風散在上

脚氣禁忌第十三

蘓唐論云醉酒房室久立冷濕地船行水氣夏

月屋中濕氣温邪熱蒸氣勞亂也鬱亂也泣憂憤亂也如此等

類好使氣發也

又云不用乘馬若能步行勞動其肺氣自然漸耗

又云晝日莫多卧ハナハナ須力ハナハナ起ハナハナ遊ハナハナ舒暢情性勿怠

睡也スル

千金方云肺氣之病強須慎房室又忌大怒ハナハナ慙

要方云凡患肺氣尤不宜眠睡ハナハナ宜數ハナハナ行ハナハナ散ハナハナ浮

腫氣不宜服補藥每月須宣洩ハナハナ佳ハナハナ

脚氣禁食第廿四



藕唐論云不宜食麵シヤウ牛肉ニク蘿蔔カブ葵アヒレ蔓菁マシロ韭ユ

又云不得食酢餅

千金方云羊ヤ牛ウシ完ツキ臭蕺菜クサ菰菜コノハ蔓菁マシロ瓠子ヒツコ

酒麵シヤウ藕油ウ乳糜カ猪雞鴨イナ並ナニ切禁キ

又云不得食諸生菓子ミ酸ス之ノ食シ犯ス之ノ者皆不可

卷

肺氣宜食第五

藕唐云常宜食シヤウ犢ウシ肉ニク犢蹄ウシ鯉イナ魚イサ鯉魚イサ猪肉ニク菟肉ウ

葱ネギ芥カイ薤シ韭ユ等及猪肝イナ肺イナ食法シ先湯中シ燠ウ使シ纒マキ

藥ハミナシ

二一六

七八四

煎切切作齋ミシウ以醬汁和水并著一抄半葱薑樹黃

令極搗極熟每食下飯大太補益得消脚氣生薑葱豉

蒜常食大佳

千金方云唯得食粳ミナシ粿ミナシ粟米ミナシ醬豉葱薤樹薑

橘皮

醫門方云食生牛乳生栗子諸下氣クダレ之物為佳

陶景本草注云昔脚弱人往栗樹下生食數升便

能起行ツ

食經云昆布雀禹云治手麻肉藕注云面鯉雀禹云主

脚疼痺

文不隨

脚氣

石決明

崔禹治  
肝諸病

治足腫方第十六

此方治  
脚腫

病源論云種玉時種及腫足也。如時<sup>完</sup>及足腫病

也。病者自膝已下至踝及指俱腫。直是也。皆由

血氣虛弱而耶傷之。經絡不流而成。亦言<sup>イハク</sup>江東諸

山縣人多病種云。彼云有草名種草。人行誤踐觸<sup>ニア</sup>

之則令病種之。

錄驗方治脚種方

掘堅實地<sup>ホチ</sup>坎作<sup>ハカリイル</sup>可容脚深<sup>イル</sup>沒<sup>イレキニ</sup>脚燒<sup>イル</sup>燒坎令赤以尿<sup>ナリ</sup>

醫心方卷八

投坎中以繩纏膝下仍以甘力遍按腫上漉血令  
患傷血出仍內契坎尿中至脚漬種塞坎上令密  
勿令氣出地冷方出脚

葛氏方治足忽得瘡病腓胫暴大如吹頭痛寒  
契筋急不即治之至老不愈方

隨病痛所在左右足對內踝直下白肉際灸三炷即  
愈後發更灸故處

又陶氏初覺此病之始股內間竅有腫處或大脉  
脹起或胫中物急煎寒不決者當檢其病

覆有赤脉而路仍灸宛其經兩三處之廿一壯末巴

豆豉アヲ少ヤイワセ雜ヤセ艾為灸主ヤイワセ

若以下至踝間ツクシ可依葛氏法如其壯至五十亦用藥

艾丸也如此應老

若數日不便ヤカ以刀破之氣四第五指間脉處

并踝下骨解泄トクメ其惡血之皆作赤色去一斗五升

亦无苦若在餘處亦破之而角款去惡血都畢

傳此大黃膏勿令得風水乃令服白頭公オキナカセ酒其

經易治且如此若良之不老更省大方

角款  
千トカメ  
名云



大黃膏方

大黃オキナクモ附子イハクハリ細辛サイシン連翹レンチウ巴豆ハド水蛭スイシツ灸シ雨アメ苦ク酒サケ

淹一宿以臘月猪膏イタクモ剪三上三下去カク滓以傳之ツグ

亦可酒服如杏核セネ

白頭公酒方

白頭オキナクモ三兩 甘草一兩 牛膝ウシノヅナ二兩 海藻アサヅキ二兩

石斛イハクハリ二兩 干地黄カンニチヨウ雨 土依根ツチヨネ雨 附子オキナクモ三兩

葛根カクレン雨 麻黃マワウ二兩

十物以酒二斗漬五日服合稍至三四合又摩治モシ

葛膏亦佳

鈞陶一名也

老膏安方

刺内踝上大脉西为卧毫又方灸外踝尖

治尸脚方第十七

病源論云尸脚者脚跟圻破也亦是冬時觸

寒氣所以如然又言脚踏死尸所卧地令脚破也

葛氏方治脚無冬夏恒圻裂者名尸脚躓死尸

所致方取鷄矢一升水二升煮數沸漬洗之半日

乃出數作老

千金方同之

新錄方治尸疔方

大麻子煮湯漬之又方搗馬薊汁洗或煮漬

之

又方煮蔓菁根漬之又方車脂塗之

治肉刺方第八

病源論云肉刺者脚指間生肉如刺謂之肉刺由

暑乾忽小指相揩而生

新錄方治肉刺方

數々塗搗也又方對糖稍刮也又方塩湯漬之

又方酢摩<sup>スル</sup>之至消又方漿<sup>ツリ</sup>汁塗<sup>ス</sup>刮去<sup>ケル</sup>又方燒金

銀釵<sup>カネシ</sup>燍<sup>ヤキ</sup>之又方薑<sup>カニシ</sup>蔞<sup>シ</sup>香<sup>ヤク</sup>流<sup>リ</sup>黃<sup>キ</sup>等分合<sup>ス</sup>研量<sup>ス</sup>

大少可刺著烙之

救急單驗方療<sup>ヤリ</sup>疔<sup>シ</sup>下<sup>リ</sup>完<sup>ル</sup>刺方

削<sup>ケツ</sup>令<sup>リ</sup>頭破<sup>ス</sup>血出<sup>ス</sup>取丹如米許<sup>ヲ</sup>拊<sup>ツ</sup>託<sup>ス</sup>最老

又方以刀子割<sup>モツ</sup>去<sup>ス</sup>刺<sup>ス</sup>即以書<sup>ヲ</sup>墨<sup>ヲ</sup>研之數十迴<sup>セウ</sup>永

大老驗<sup>アリ</sup>

治手足凍腫創方第十九  
コイ 持目振至腔中

病源論云凍爛腫創嚴冬之月觸<sup>フル</sup>胃<sup>シ</sup>風雪寒

毒之氣傷於肌膚血氣壅滯目即大素淫所至及  
中寒瘡也瘡凍爛赤疼腫便成凍創乃至皮肉  
爛潰重者文節墮落

葛氏方治手足中寒雪凍腫創爛方

車膏溫令契以灌之洋脂雜蜜之佳

又方溫醵薑汁漬之又方契煮小便以漬之

又方燒黍粟若麥藁作灰以水和煮令契

穿器盛於甬中滴創上半日中為之

千金方云若冬月胃涉凍冰面目手足緣壞乃始

藁  
孫樞云  
之釋也



契痛欲瘕者シモクナ取麥葉オナメ令煮濃汁契洗之

又玄凍拍欲墮方オナメ

馬矢三升水三升煮令沸漬半日愈經心方同之

新錄方

契翅イテ散カムクナ粉上コシ又方煮松葉洗之

集驗方治凍瘡方以蠟トイ洋灌之ツグ

治手足輝裂方アカハ第廿

病源論云輝裂者肌肉破也ハ言冬特觸胃風寒手

足破故謂之輝裂也力折反

葛氏方治冬天手足皴裂<sup>ア</sup>血<sup>シモクチセシ</sup>及疥凍方

取麦苗煮令濃<sup>ハタカニシテ</sup>熱<sup>イ</sup>的<sup>ハタカニシテ</sup>尔以洗漬之

千金方治手足破裂<sup>ヒシキ</sup>血<sup>ヒシキ</sup>为疼痛方

猪<sup>ナグサ</sup>胆<sup>ナグサ</sup>着<sup>ナグサ</sup>契<sup>ナグサ</sup>酒中以洗之即<sup>ナグサ</sup>差<sup>ナグサ</sup>

集驗方手足<sup>シモクチセシ</sup>疥<sup>シモクチセシ</sup>瘰<sup>シモクチセシ</sup>方

蜀<sup>シモクチセシ</sup>樹<sup>シモクチセシ</sup>四合以水一斗煮三沸去滓以洗漬之

蘇敬本草注 白<sup>カム</sup>芫<sup>カハ</sup>以填<sup>アム</sup>之<sup>ミナヨ</sup>効

范汪方

取<sup>キツハ</sup>葱<sup>シホニ</sup>葉<sup>シホニ</sup>萎<sup>シホニ</sup>黃<sup>シホニ</sup>葉<sup>シホニ</sup>煮<sup>シホニ</sup>以<sup>シホニ</sup>漬<sup>シホニ</sup>洗<sup>シホニ</sup>之<sup>シホニ</sup>良<sup>シホニ</sup>

新錄方 咋<sup>カム</sup>蘇<sup>ス</sup>封<sup>ツク</sup>之

又方車工<sup>クルマ</sup>脂<sup>アキラ</sup>塗<sup>ス</sup>之

治<sup>ヒ</sup>辛<sup>ヒ</sup>足<sup>ヒ</sup>發<sup>ヒ</sup>胆<sup>ヒ</sup>方<sup>ヒ</sup>第<sup>ヒ</sup>廿<sup>ヒ</sup>一

病源論云人<sup>ヒ</sup>辛<sup>ヒ</sup>足<sup>ヒ</sup>忽<sup>ヒ</sup>然<sup>ヒ</sup>皮<sup>ヒ</sup>厚<sup>ヒ</sup>澁<sup>ヒ</sup>而<sup>ヒ</sup>圓<sup>ヒ</sup>強<sup>ヒ</sup>如<sup>ヒ</sup>壘<sup>ヒ</sup>者<sup>ヒ</sup>謂<sup>ヒ</sup>

之<sup>ヒ</sup>疥<sup>ヒ</sup>胆<sup>ヒ</sup>此<sup>ヒ</sup>由<sup>ヒ</sup>血<sup>ヒ</sup>氣<sup>ヒ</sup>沉<sup>ヒ</sup>行<sup>ヒ</sup>不<sup>ヒ</sup>榮<sup>ヒ</sup>其<sup>ヒ</sup>表<sup>ヒ</sup>故<sup>ヒ</sup>皮<sup>ヒ</sup>澁<sup>ヒ</sup>厚<sup>ヒ</sup>

而<sup>ヒ</sup>成<sup>ヒ</sup>胆<sup>ヒ</sup>也<sup>ヒ</sup>

葛<sup>ヒ</sup>氏<sup>ヒ</sup>方<sup>ヒ</sup>辛<sup>ヒ</sup>足<sup>ヒ</sup>忽<sup>ヒ</sup>發<sup>ヒ</sup>胆<sup>ヒ</sup>方<sup>ヒ</sup>

取<sup>ヒ</sup>染<sup>ヒ</sup>米<sup>ヒ</sup>粉<sup>ヒ</sup>鐵<sup>ヒ</sup>鎔<sup>ヒ</sup>藥<sup>ヒ</sup>令<sup>ヒ</sup>赤<sup>ヒ</sup>以<sup>ヒ</sup>衆<sup>ヒ</sup>人<sup>ヒ</sup>唾<sup>ヒ</sup>和<sup>ヒ</sup>之<sup>ヒ</sup>以<sup>ヒ</sup>塗<sup>ヒ</sup>

上<sup>ヒ</sup>厚<sup>ヒ</sup>一<sup>ヒ</sup>寸<sup>ヒ</sup>即<sup>ヒ</sup>消<sup>ヒ</sup>范<sup>ヒ</sup>注<sup>ヒ</sup>方<sup>ヒ</sup>

玉<sup>ヒ</sup>筋<sup>ヒ</sup>稍<sup>ヒ</sup>方<sup>ヒ</sup>以<sup>ヒ</sup>塩<sup>ヒ</sup>塗<sup>ヒ</sup>胆<sup>ヒ</sup>上<sup>ヒ</sup>令<sup>ヒ</sup>牛<sup>ヒ</sup>脂<sup>ヒ</sup>之<sup>ヒ</sup>不<sup>ヒ</sup>過<sup>ヒ</sup>三<sup>ヒ</sup>

又方作艾炷灸其上三壯

新錄方 以溫尿漬老

治平足逆臚方第廿二

病源論云逆臚者平足凡甲際皮利起謂之逆臚

風邪入於腠理而氣不和致也

千金方平足逆臚方

五青珠一分 平薑二分 搗以粉瘡上日三

名琅玕者赤珠也 猪脂和塗之

枕中方治人平足廉理方 取榆樹孔中水洗即

細如指指以

治代指ツハス方第廿三

病洎論云代指者其指先腫攸ハ與痛病其色不黯名

然後方緣メクリ爪甲邊結膿アリ者今ニ爪甲脫也亦名代甲ツツ

亦名糟指亦名主竈夫ハ者ハ筋之餘也オ由筋骨

契ハ感ハ濕不通故腫結生膿而爪甲脫去ス

小品方治代指法

單煮甘草ツ瀉アヲ之若元具付草內其消汁瀉アヲ之但

蛙得一種カ冷藥カ甘草菜汁瀉アヲ之今ニ甘草二兩水本元



九升煮取

一升云々

葛氏方代指方

煮地榆根作湯漬之半日甚良

王仲子

又方以指刺炊飯中七レカク二七遍良 已上千金方同之

過本一作

又方以泥カハイ指カハイ令通カハイ通厚一寸許以イニ內ヤウキ契ヤウキ灰中ヤウ炆

之泥カハイ燉カハイ惟カハイ視カハイ指皮カハイ縮者即愈也不縮者更為

之

千金方代指方 麻沸湯漬之即愈

又方先剝去膿アタリ灸アタリ鮮皮令温アタリ以アタリ錐アタリ裹周アタリ逆痛

アタリ

心便愈 又方取萎黃ナル葱葉煮漬之

又云割七キ甲侵シ完成漏不差方 付キル樊石未裹之以老

為限

又方搗マキ鼈ウツキ黏草根和猪脂マコ付取老心

新錄方代指方

酢和ヤハヒ炭灰ヤハヒ封日二三 又方塩湯漬之良

集驗方代指方

單煮甘草漬之 又方用芒消ヤハヒ汁漬之

僧深方代指方 作ヤハヒ艾主心灸痛上七壯

治拍制<sup>セキ</sup>手<sup>セキ</sup>痛方第廿

葛氏方拍忽掣痛不可堪轉上入方

灸病拍頭七壯立老 千金方同之

又云拍端忽發瘡方 燒鐵<sup>ヤイ</sup>令赤<sup>鐵</sup>以灼之

又去卒五指筋<sup>ヒナ</sup>痺急不得<sup>ヒナ</sup>屈申方灸<sup>ヤク</sup>手踝骨

上數壯

千金方拍掣痛方 將<sup>ヒシホ</sup>臂清和蜜溫塗之愈 經心方同之

又云拍疼<sup>ヒシク</sup>散腕方

猪脂和塩<sup>ヒシ</sup>壯者令消<sup>ヒシ</sup>契<sup>ヒシ</sup>內拍<sup>ヒシ</sup>凡中食又老

習心方卷第八

習心方卷第八

三十一

癸酉八月廿六日

三十一

八〇二

--	--	--	--	--	--	--	--	--



醫心方卷第八背記

天養二年二月以宇治入道太相國本移點

移點 少内記藤原中光 比校 助教清原定安

移點比校之間所見及之不審直誦中原師長

醫博士丹波知康重成等相共合醫百家本早

文殿所加之勘物師長以墨書之令朱合點

宇治本

初下點 行盛朝臣 朱星點 墨假字

重加點 重基朝臣 朱星點 假字 勘物又以朱點句

御本不改彼樣令點移之

以上第一葉

秒禾穗芒也分秒定禾數十二秒而當一粟十二粟而當一寸作兩子作穗

以上第六葉

瞽心方卷第八札記

二頁上 夏苦 案夏蓋憂之或體非春夏之夏 行 下三 衣

靴帽 帽記 六行上 諸言 十金無 六行上 几脚 几記

十一頁 故秣乳 案秣乳恐即秣一與同玉篇秣巾也

一語言 十六頁 勢之 新修鑑類共同案勢恐與之訛證

也 十八頁 七升枚 案七升二字巨解 廿頁下 論云

案此未詳所出 世四頁 率急 率訛



醫心方 二

日本古典全集之内

編纂者

正宗

敦

夫

發行者

東京市豊島區長崎町三丁目一六一  
合資會社  
代表社員

日本古典全集刊行會  
長嶋東一

印刷者

東京市芝區金杉新道町一二

單式印刷株式會社 和田助一

發行所

東京市豊島區長崎町三丁目六一  
合資會社

日本古典全集刊行會


昭和十年二月十五日印刷  
昭和十年二月二十日發行

【非賣品】

振替東京七三〇三二













UNIVERSITY OF TORONTO  
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER  
COLLECTION

*purchased from  
a gift by*

THE DONNER CANADIAN  
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 4868

